



臺安醫院病患用藥指導單

主成份：Acetaminophen

商品名及含量：

1. Depyretin Tablet (得百利寧錠)：每錠含有 500 毫克
2. Bubdel Tablet (普德錠)：每錠含有 80 毫克
3. Anti-phen Syrup (安佳熱糖漿)：每毫升含有 24 毫克，每瓶含 60 毫升

作用：抑制中樞前列腺素的合成，具有解熱、止痛的作用。

劑量與用法：

每日服用次數及每次劑量，請遵照醫囑。

孕婦用藥安全：人體試驗顯示低危險性。孕婦可使用。

哺乳用藥：哺乳期嬰兒不會造成不良的影響

注意事項：

1. 高劑量或長期使用時，需要監測肝、腎功能，特別是有肝臟疾病的患者。
2. 服藥期間應避免喝酒。
3. 有下列情形時，請事先告知醫師：曾對此藥過敏或其他藥品過敏；正在服用其他藥品（特別是carbamazepine、phenobarbital、phenytoin、rifampin或sulfipyrazone）；有肝臟疾病病史；懷孕及授乳期。

忘記服藥時該怎麼辦？

用於解熱、止痛時，如有需要可立即補服。若已接近下次服藥時間則不補

服，仍按原時間服藥，不可一次服用雙倍量。

可能的副作用有哪些？

如果發生了該怎麼辦？

1. 肝毒性黃疸；服藥過量症狀包括腹瀉、沒有食慾、噁心、嘔吐、胃部痙攣或胃痛、排汗增加、上腹漲或痛。
☞如何處理：請停藥並立即就醫
2. 血便或黑便、血尿、尿液變濁、發燒、下背痛、皮膚紅點、皮疹、癢、嘴唇白點或潰瘍、喉嚨痛、尿量減少、疲倦。
☞如何處理：請儘速就醫

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 106.10

“喜樂的心，乃是良藥。”（箴言17:22）