



臺安醫院病患用藥指導單

主成份：Acyclovir

商品名及含量：

Deherp Tablet 庖寧錠（每錠含有Acyclovir 200毫克）

作用：

用於皮膚、嘴唇、生殖器的庖疹以及帶狀庖疹。

劑量與用法：

1. 請遵照醫囑及藥袋上的指示服用，有任何疑問應請教醫師或藥師，並在庖疹症狀出現時，儘早服用。
2. 若用於治療庖疹，Acyclovir 通常一天五次，為睡眠時間外每四小時服用一次，連續服用七至十天。
3. 用藥期間宜定期追蹤腎臟功能。

孕婦用藥安全：人體試驗顯示無危險性

哺乳用藥：哺乳期嬰兒不會造成不良的影響

注意事項：

1. 保持感染部位的乾燥及清潔，穿著寬鬆舒適之衣物，以避免刺激傷口。
2. 感染生殖器庖疹時，應避免性行為，以防止庖疹病毒之傳播。

3. 服藥前若有下列情形者應告知醫師：

- 正在服用降尿酸藥物，如probenecid（倍耐黴Benemid）或抗病毒藥物，如zidovudine（立妥威）者。
- 懷孕或餵母乳的婦女。
- 有腎臟疾病的病人。

4. 不要將剩餘藥物留置到以後感染時使用，因為此藥可能失效。

5. 不要將本藥給其他人服用。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用。若想起時已經接近下一次服用的時間，則跳過一次，依照原來下一次的服用時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

可能的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

1. 幻覺或全身抽筋現象。

☞請立即就醫。

2. 頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉等。

☞如何處理：與食物或牛奶一起服用以減低症狀，若情形嚴重時請告知醫師。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 106.10

“喜樂的心，乃是良藥。”（箴言17:22）