



臺安醫院病患用藥指導單

主成份：Sulfonylureas

商品名及含量：

1. Gliben Tablet (固利康錠)，每錠含有Glyburide (Glibenclamide) 5毫克
2. Amaryl Tablet (瑪爾胰錠)，每錠含有Glimepiride 2毫克

作用：用於第二型糖尿病病人，以增加體內胰島素的分泌，以降低血糖。對於第一型糖尿病則無效。

劑量與用法：

1. 遵照醫師處方按量按時服用。
2. 每天服用一次者於早餐，每天兩次者於早、晚餐的飯前30分鐘或隨餐服用。

孕婦用藥安全：人體試驗顯示對胎兒有低危險性。胰島素是孕婦治療糖尿病的首選藥物。

哺乳用藥：現有證據顯示該藥對哺乳嬰兒不會造成危險。考慮嬰兒可能低血糖，建議於哺乳期間最好改用胰島素治療。

注意事項：

1. 飲食及運動應規律，定量且定時。延遲飲食或過度運動會引起低血糖。
2. 服藥期間應告知醫師所有服用藥物。
3. 如懷孕或授乳應告知醫師，一般懷孕之糖尿病應以胰島素控制。
4. 應告知醫師腎、肝、心臟、甲狀腺、嚴重感染及內分泌等疾病。
5. 有些人服藥後會對陽光敏感，應避免晒太多陽光或適度防曬。
6. 遵醫囑飲酒適量。因飲酒可能引起低血糖，有的引起胃痛、噁心、嘔吐、頭痛、冒汗等反應，故應避免。

7. 確實遵醫囑檢驗血糖、尿糖，以便醫師評估療效，調整劑量。
8. 如有高血糖症狀(極度口渴、多尿、皮膚乾燥、複視、噁心嘔吐等)應告知醫師，以調整劑量或飲食。
9. 如有任何手術、牙科處置及急診處理，應告知醫師服用此類藥品。

忘記服藥時該怎麼辦？

儘快服用，但如果與下次服藥時間相近，則按時服下次的劑量，但不可服用二倍量。

可能的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

1. 低血糖 (極度飢餓感、心悸、顫抖、持續發冷、冒冷汗、昏亂、頭痛等)
☞如何處理：輕度時立即吃含糖飲料或食物，如果汁、糖水或方糖，如未見改善，則應送急診。如嚴重時發生痙攣、昏迷時，不可進食，應立即送急診。
2. 皮膚發疹、發癢、發紅、嚴重晒傷；皮膚、眼睛變黃，大便顏色變淡、尿色變深；不正常出血或瘀血；喉嚨痛、持續發燒等。
☞如何處理：請立即就醫
3. 味覺改變、腹瀉或便秘、排尿量與頻率增加、腸胃不適。
☞如何處理：如症狀持續於就診時應告知醫師。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 107.6

“喜樂的心，乃是良藥。” (箴言17:22)