



臺安醫院病患用藥指導單

主成份：Atorvastatin

商品名及含量：

Lipitor Tablet 立普妥膜衣錠(每錠含有 Atorvastatin)

作用：降低血中膽固醇及三酸甘油脂，減少心血管疾病及中風的發作。

劑量與用法：請遵照醫師指示的用法、藥量及時間服用。若有任何不了解，請詳詢醫師或藥師。

孕婦用藥安全：懷孕第一期禁止使用

哺乳用藥：禁止哺乳

注意事項：

1. 沒有醫師指示，請勿自行停藥。
2. 本藥不可與葡萄柚汁併服。
3. 若曾因服用此類藥品而發生過敏者，必須告知醫師及藥師。
4. 請告知醫師及藥師，您正在服用的藥品（包括處方藥及成藥），尤其是cyclosporine (Sandimmune)、digoxin (Lanoxin)、erythromycin、itraconazole (Sporanox)、rifampin (RIF) 或其他降血脂藥品 (bezafibrate (Bezalip)、fenofibrate (Lipanthyl)、gemfibrozil (Lopid)、niacin (Nyclin)) 等。
5. 若您曾有肝病、腎臟病、心臟病、嚴重感染、低血壓或痙攣發作，請告知您的醫師。

6. 懷孕和授乳者應避免使用。若您已經懷孕、計劃懷孕或正在哺乳，請告知您的醫師。若於服藥期間發現懷孕，則立刻停藥並回診。

7. 若將要動外科手術（包括牙科手術）請告知您的醫師或牙醫師，正在服用之藥名。

8. 可能使您的皮膚對日曬敏感，避免不需要的日曬，或縮短日曬時間，並做好防曬措施（如著長袖、太陽眼鏡、擦防曬油）。

9. 酒精可能增加此類藥品之副作用，服藥期間若需飲酒，請先和您的醫師討論安全性的問題。

忘記服藥時該怎麼辦？

如果忘記服藥，想起時儘快服用。如果想起時幾乎接近下次服藥時間，則不補服，依照原來時間服用下一次的劑量即可，絕不可一次服用雙倍劑量。

可能的副作用有哪些？

如果發生了該怎麼辦？

1. 肌肉疼痛、觸痛、虛弱無力或痙攣（無論是否有發燒）
☞如何處理：應立即回診，告知醫師
2. 脹氣、胃痛或痙攣、便秘或腹瀉、胃灼熱、頭痛、視力模糊、頭暈、
皮疹或癢、胃腸不適
☞如何處理：若症狀嚴重或未改善，應回診告知醫師

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 106.10

“喜樂的心，乃是良藥。”（箴言17:22）