



臺安醫院病患用藥指導單

主成份：Co-trimoxazole

商品名及含量：

1. Baktar Tablet, (孟克杏) 每錠含有Sulfamethoxazole 400毫克& Trimethoprim 80毫克
2. Sulfacotrim Suspension(沙法克寧懸液劑)，每毫升含有 Sulfamethoxazole 40毫克&Trimethoprim 8毫克，每瓶60毫升

作用：

本藥適用於細菌引發之各種感染病症，包括泌尿道、肺、耳朵、消化道的感染。也用於治療旅行者腹瀉，及預防與治療由肺囊蟲引起之肺炎。

劑量與用法：

本藥需由醫師處方服用，劑量用法依人及病情而異。請務必遵照醫囑或藥袋上之指示按量按時服用。有任何疑問應請教醫師或藥師。本藥通常一天服用兩次，每次一到兩錠，且應按平均的用藥間隔服用（如每天2次即每12小時服用一次）。用於肺囊蟲肺炎時之劑量可能較高，服用次數亦可能更頻繁。懸液劑應先搖勻再使用。

孕婦用藥安全：人體及動物試驗顯示對胎兒具危險性。(Trimethoprim)

哺乳用藥：美國兒科醫學會將此藥(含 sulfamethoxazole+trimethoprine)歸類於授乳婦可使用藥物。

注意事項：

1. 服用本藥前若有下列情形者應事先告知醫師：
 - ◆曾對磺胺類藥物或口服降血糖藥物過敏者

- ◆有肝臟疾病，腎臟疾病，氣喘或嚴重過敏體質者
- ◆G-6PD 缺乏者（即俗稱蠶豆症患者）
- ◆已懷孕或準備懷孕及餵母乳的婦女

2. 每天至少應喝八杯水或其它飲料
3. 本藥可能使皮膚對日光的感受性增強，必要時可穿長袖長褲等防護性的衣物或使用防曬製品。
4. 不可擅自停用藥物，即使自己覺得症狀改善仍應依照醫囑將藥物全部服用完畢以免病症再度復發。若已經將全部藥物服用完畢，病症仍未改善，應再就醫，不可自行購藥服用。
5. 不可將本藥給其他人服用。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用。若想起時已經接近下一次服用的時間，則跳過一次，依照原來下一次的服用時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

可能的副作用有哪些？

如果發生了該怎麼辦？

1. 皮膚出現紅疹、搔癢感或脫皮現象、喉嚨刺痛、發燒、寒顫、不正常的皮下瘀血或出血，皮膚或眼睛變黃，關節疼痛等。
☞如何處理：請停藥，並立即就醫。
2. 噁心，嘔吐，食慾不振等症狀。
☞如何處理：與食物一起服用。當情況嚴重或持續發生時，請告知醫師。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 107.06

“喜樂的心，乃是良藥。”（箴言17:22）