



臺安醫院病患用藥指導單

主成份：Clindamycin

商品名及含量：

Lindacin Capsule 利達信黴素膠囊（每膠囊含有Clindamycin 150毫克）

作用：本藥品為抗生素，用於細菌引起之感染。

劑量與用法：

用法和劑量遵照醫師指示使用。服用時伴隨一整杯開水服下；以免黏於食道造成發炎。同時最好依給藥次數將每次的服藥時間平均分佈於一日中，不可隨便停藥。

孕婦用藥安全：人體試驗顯示無危險性

哺乳用藥：哺乳期嬰兒不會造成不良的影響

注意事項：

1. 服用本藥前有下列事項請告知醫師：懷孕或哺乳、曾有藥物過敏、其他疾病（如肝、腎疾病、胃腸疾病或結腸炎）或同時服用它種藥物。讓醫師決定是否應用藥。
2. 治療期間即使感染症狀消失，不可擅自停藥，仍需繼續使用，完成整個療程才能根治。否則可能會復發。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用。若想起時已經接近下一次服用的時間，則跳過一次，依

照原來下一次的服用時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

可能的副作用有哪些？

如果發生了該怎麼辦？

1. 皮膚發疹紅腫發癢、莫名的喉嚨痛或發燒、不尋常的瘀血或出血情況。
☞如何處理：請立刻停藥並就醫。
2. 如腹瀉持續二天以上，或一天排便超過五次或有血便情形。
☞如何處理：請立即就醫，在未告知醫師前請勿服用任何止瀉劑。
3. 噁心嘔吐、腹痛、腹瀉，或陰部搔。
☞如何處理：請告知醫師。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 106.10

“喜樂的心，乃是良藥。”（箴言17:22）