



臺安醫院病患用藥指導單

主成份：Clomid

商品名及含量：

Clomid 快樂妊錠(每錠含有 Clomiphene Citrate 50 毫克)

作用：誘導排卵。

劑量與用法：

遵照醫囑，每日同一時間服用。

孕婦用藥安全：孕婦禁止使用

哺乳用藥：藥物的特性顯示可能會給哺乳嬰兒帶來臨床毒性，因此不建議哺乳。

注意事項：

1. 服用本藥前有下列事項，請告訴醫師：懷孕或哺乳。肝病、卵巢囊腫、憂鬱症、血栓靜脈炎、不正常陰道出血、甲狀腺疾病或同時服用之其它藥物。
2. 如服此藥後懷孕，停藥並馬上告知醫師。
3. 服用此藥可能會有多胎，請和醫師討論。
4. 服此藥可能會改變視力，應小心避免開車或操作機械。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時要儘快補服。如果想起時已接近下一次服藥時間，請告知醫師，取得另外的指示，不要將忘記的量和下一次的量一起服用。

可能的副作用有哪些？

如果發生了該怎麼辦？

1. 嚴重下腹痛、噁心、嘔吐、體重增加

☞如何處理：請立即就醫

2. 視力減退、複視或其它視力問題、看光會眨眼、眼睛對光敏感。眼睛或皮膚變黃。

☞如何處理：請儘速就醫

3. 嚴重腹瀉或嘔吐。

☞如何處理：請告知醫師，尤其是症狀持續或嚴重時。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 106.10

“喜樂的心，乃是良藥。”（箴言17:22）