



臺安醫院病患用藥指導單

商品名及含量：

Gestrin Capsule ”培力”佑汝膠囊（每膠囊含有Gestrinone 2.5毫克）

作用：它是合成的類固醇荷爾蒙，具抗黃體脂酮性質，治療子宮內膜異位。

劑量與用法：通常一星期服2次，在月經週期來的第1天及第4天服用，每次1粒。以後固定每週相同的2天，且最好於相同時間服用本藥。請遵醫囑服用，不可擅自停藥。

孕婦用藥安全：孕婦禁用*

哺乳用藥：不可以哺乳*

注意事項：

1. 服藥期間定期抽血監測肝功能。
2. 月經不規則者請先做懷孕檢驗，需確定未懷孕才可服藥。懷孕或哺乳者請勿服用。服用期間應使用非口服避孕的方法避孕，懷疑懷孕應停止服用並告知醫師。
3. 服藥期間可能月經不規則或無月經。停止服藥後**18天~36天**會開始規則月經，若無則告訴醫師。
4. 服用本藥前，如果你有偏頭痛，心臟病、肝或腎臟疾病，癲癇，中風，血栓性疾病或乳癌，或同時服用避孕藥、抗癲癇藥、結核病藥，可能會干擾本品，要告知醫師。

忘記服藥時該怎麼辦？

如果忘記服藥一次，則於發覺時立即服用一顆，並持續原來的服藥週期，維持每週二天服藥。如果忘記二次或更多次，則停止服藥，等到下一個月經週期開始，確定無懷孕跡象時再重新開始療程。

可能的副作用有哪些？ 如果發生了該怎麼辦？

1. 皮疹，皮膚或眼睛泛黃，持續頭痛，持續胃不適、肚子痛、嘔吐。
☞如何處理：請立即就醫
2. 痤瘡、頭髮或皮膚油膩，肌肉痙攣，經常疲倦或虛弱，水腫、體重增加，女性乳房縮小、月經不規則、陰蒂肥大、聲音改變、多毛症。
☞如何處理：請儘速就醫
3. 皮膚潮紅，心情改變、神經質，陰道乾澀、癢、灼熱、陰道出血。
☞如何處理：若症狀持續，請告知醫生

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 107.6

“喜樂的心，乃是良藥。”（箴言17:22）