



臺安醫院病患用藥指導單

主成份：Metformin HCl

商品名及含量：

Glucophage 庫魯化錠（每錠含有 Metformin HCl 500 毫克）

作用：加強胰島素的作用，以降低血糖。

劑量與用法：由較低劑量開始，逐漸增加用量，且隨餐服用，可減少胃腸方面如腹瀉、噁心、嘔吐、脹氣等副作用。

孕婦用藥安全：人體試驗顯示對胎兒有低危險性

哺乳用藥：哺乳期嬰兒不會造成不良的影響

注意事項：

- 為使糖尿病受到良好控制，請遵醫囑控制飲食飲、酒量，運動應規律，檢查血糖、糖化血紅素及尿糖，並定期做腎功能檢查。**
- 懷孕期間最好用胰島素控制血糖。授乳時應告知醫師，由其決定停止授乳或停藥。
- 於手術禁食期間暫時停藥。恢復進食後，且腎功能正常時，再恢復給藥。
- 如有發高燒、嚴重外傷、感染、手術等重大壓力情況，可能血糖暫時失控而須改用胰島素，至恢復正常為止，故應告知醫師。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時要儘快補服，但如果已經很接近下一次服藥時間，則跳過一次，而

照原來時間服用下一次的劑量，不可一次服用雙倍劑量。

可能的副作用有哪些？ 如果發生了該怎麼辦？

- 單獨服用時，一般不會引起低血糖。
但與硫醯基尿素類藥物、胰島素或酒精併用時，有可能產生低血糖（心悸、冒冷汗、極度飢餓感、頭痛、昏亂）。
☞如何處理：輕度時立即吃含糖飲料或食物，如果汁、糖水或方糖，如未見改善，則應送急診。
如嚴重時發生痙攣、昏迷時，不可進食，應立即送急診。
- 乳酸血症為極少發生，但極嚴重之副作用。於腎或肝功能不佳、缺氧、飲酒過度、脫水等病人較易發生。服藥一段時間後，若發生胃腸不適，應注意是否為乳酸血症的初期症狀。
☞如何處理：如有不明之換氣過度、肌肉疼痛、不適或嗜眠等症狀，應立即停藥並就診。
- 嚴重腹瀉或嘔吐。
☞如何處理：需暫時停藥

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 106.10

“喜樂的心，乃是良藥。”（箴言17:22）