



臺安醫院醫事人員用藥指導單

主成份：每Amp (2mL)含有Diazepam 10mg

樂平注射液 5公絲/公撮

適應症：

焦慮狀態、失眠、肌肉痙攣、癲癇重積狀態。

用法：

注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 避光儲存 不可與其他溶液、靜脈輸液或藥品混合或稀釋，因為會發生 diazepam 沉澱。 diazepam 會被輸液袋或輸液管所吸附。 PVC 材質之容器或輸液管不宜。 									
	給藥途徑	配製溶液	配製濃度	配製後儲 存時效 (室溫)	配製後儲 存時效 (冷藏)	輸注之稀 釋液	每瓶稀釋 液體積	稀釋後儲 存時效 (室溫)	稀釋後儲 存時效 (冷藏)	給藥濃度
deep IM	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
IV	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦	不建議稀釋	slowly : 2-5mg/min ² ; 嬰兒及孩童 ≥3min 輸 注， ≤0.25mg/kg
IVD ³	◦	◦	◦	◦	◦	NS ¹ , D5W ¹ , R ¹ , LR ³	◦	◦	◦	5mg/50-100ml ¹

孕婦用藥安全：人體試驗顯示第一孕期及第三孕期有危險性。

哺乳用藥：有限的人體試驗，藥物的特性顯示可能會給哺乳嬰兒帶來臨床毒性。不建議授乳婦使用。

注意事項：

1. 注射本劑前後不可飲酒、亦不可併用葡萄柚汁。
2. 注射本劑後應避免操作技巧性工作，如駕駛。

3. 使用本藥品後可能出現夢遊行為：例如開車、打電話及準備與服用食物。

副作用：

如有以下副作用應就醫：

1. 口腔或喉持續潰瘍或疼痛
2. 幻想或無法入睡或異常興奮、神經質→矛盾反應
3. 精神紊亂→無法耐受或超劑量
4. 精神抑制
5. 皮疹或搔癢→過敏反應
6. 喉痛及發燒→Agranulocytosis

當以下症狀持續時應就醫：不安、便秘或腹瀉、眩暈、頭昏眼花、頭痛、思睡、噁心、嘔吐、說話不清、胃痛、異常疲勞、虛弱

儲存條件：

儲存陰涼（15~30°C）避光處所，並避免冷凍。

資料來源：

1. 藥品仿單
2. AHFS Drug Information 2018
3. Drug in Pregnancy and Lactation 11th Edition

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 107.7

“喜樂的心，乃是良藥。”（箴言17:22）