



# 臺安醫院醫事人員用藥指導單

**主成份：** Each mL contains Morphine Hydrochloride 10mg

鹽酸嗎啡注射液 10 毫克/毫升

**適應症：** 鎮痛<本院用於術後止痛>

**途徑：** <本院術後止痛：硬膜外注射>

給藥途徑	配製溶液	配製濃度	配製後儲 存時效 (室溫)	配製後儲 存時效 (冷藏)	輸注之稀 釋液	每瓶稀釋 液體積	稀釋後儲 存時效(室 溫)	稀釋後儲 存時效 (冷藏)	給藥濃度	給藥速率
SC, IM										
IV					D5W, NS,W		24hr		0.5-3mg/ml	Slowly>4-5min
IVD,持續 SC (PCA)					D5W, NS		24hr		0.1-1mg/ml	

## 孕婦用藥安全：

人體試驗證據顯示對胚胎具危險性，懷孕末期使用可能增加新生兒呼吸抑制及戒斷症狀。孕婦宜避免使用。若媽媽一定要使用的情況，其危險性仍是可接受的。

**哺乳用藥：** 有限的人體試驗資料，藥物的特性顯示可能會給哺乳嬰兒帶來臨床毒性。美國兒科醫學會將此藥歸類於授乳婦可使用藥物。

## 禁忌：

1. 嚴重呼吸抑制者(會增強呼吸抑制)
2. 支氣管喘息發作者(會妨礙氣管分泌)
3. 嚴重肝功能障礙者(有昏睡之副作用)
4. 慢性肺部疾患併發心不全者
5. 痙攣狀態者
6. 急性酒精中毒者
7. 阿片生物鹼過敏者

## 注意事項：

■ 一般應注意事項：

1. 有產生藥物依賴性之可能，使用時應注意觀察。連續使用期間如急速減量會產生諸如流淚、流汗、噁心、嘔吐、下痢、腹痛、散瞳、頭痛、失眠、不安、譫妄、震顫、全身肌肉關節痛、呼吸急迫等戒斷症狀。
- 本品與下列藥品併用又喝酒時會增加藥效，給藥時應特別留意：  
Phenothiazine衍生物、Barbituric acid衍生物等中樞神經抑制劑、吸入性麻醉劑、Monoamine氧化酵素阻礙劑、三環系抗鬱劑、β-阻斷劑、Coumarins系抗凝血劑。

## 常見的副作用有哪些？

噁心、便秘、皮膚搔癢、輕微的鎮靜嗜睡。

## 醫護人員需及早介入的症狀：

1. 明顯呼吸抑制現象(病人不易被喚醒或呼吸頻率小於每分鐘8次)
2. 混亂或躁動
3. 血氧和度低於 90%
4. 止痛效果不佳
5. 嘔吐

## 過量之處置：

本劑引起之呼吸抑制可用Naloxone 注射劑拮抗。

**儲存條件：** 避光儲存於室溫下。

**資料來源：** 仿單、Drug information handbook 15<sup>th</sup>、Drug in Pregnancy and Lactation 11<sup>th</sup>、急性疼痛病人成癮性麻醉藥品使用指引

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

**藥物諮詢專線：** (04)2360-2000 轉2188

**藥劑科最新修訂日期** 107. 7

**“喜樂的心，乃是良藥。” (箴言17:22)**