



臺安醫院醫事人員用藥指導單

主成份： Each mL contains Pethidine Hydrochloride 50mg

鹽酸配西汀注射液 50毫克/毫升

適應症：

1. 急性發作之中重度以上的疼痛，且病人曾經因使用Morphine而發生難以處理的不良反應或有其禁忌症。
2. 治療麻醉後顫抖

用法：

給藥途徑	配製溶液	配製濃度	配製後儲存時效(室溫)	配製後儲存時效(冷藏)	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	稀釋後儲存時效(室溫)	稀釋後儲存時效(冷藏)	給藥濃度	給藥速率
SC, IM										
IV	w	10mg/ml			D5W,G/S,NS,LR		24hr			SLOW

*注意：即使在正常腎功能之成人，不應連續使用超過48小時，或每日超過600mg。

孕婦用藥安全：

人體試驗證據顯示對胚胎具危險性，孕婦宜避免使用(Human data suggest risk)。

哺乳用藥： 授乳婦可使用。

禁忌：

1. 對正在使用或近期14天內內曾使用MAO inhibitors者為使用禁忌；因併用可能造成高血壓危象、體溫過高和心血管系統失能併可能致死。
2. 新生兒與六個月以下嬰兒

注意事項：

☞ 全身痙攣

本品會加重痙攣患者之症狀。如因耐藥性增加致使使用劑量明顯超過建議

劑量時，亦有可能使無痙攣病史者產生痙攣現象。

☞ 耐藥性

本品會產生類似嗎啡之耐藥性而有濫用之虞，連續使用會因而產生心理、生理依賴性及耐藥性，因此處方及使用時均應與嗎啡同等注意。

可能的副作用有哪些？

1. 會發生呼吸抑制，及某些程度的循環抑制；也有可能發生呼吸停止、休克及心跳停止等現象。
2. 常見的包括眩暈、鎮靜、噁心、嘔吐、流汗。

過量症狀及處置：

☞ 症狀

本品嚴重過量會導致呼吸抑制、嚴重嗜眠至昏迷、骨骼肌弛緩、發冷及濕黏皮膚、有時會導致心動徐緩及低血壓，甚至會發生窒息、循環虛脫、心跳抑制及死亡。

☞ 處置

靜脈注射Naloxone是對抗由配西汀等麻醉藥品過量或麻醉藥品過敏所引起呼吸抑制的特殊解毒劑。

儲存條件： 避光儲存於室溫下。

資料來源： 仿單、Drug information handbook 15th、Drug in Pregnancy and Lactation 11th、食品藥物管理局Pethidine使用指引

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線： (04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 107. 7

“喜樂的心，乃是良藥。” (箴言17:22)