



臺安醫院病患用藥指導單

主成份：每錠含有 Metronidazole 250毫克

商品名及含量：Terico-S 250mg/Tab 特立克益舒錠 250 毫克

作用：用於生殖道、腸道及其他部位的感染。

劑量與用法：

用法和劑量遵照醫師指示使用。有任何問題請教藥師或醫師。

孕婦用藥安全：人體試驗顯示低危險性。建議滴蟲病或細菌性陰道感染孕婦於懷孕第一期禁用，第二期至第三期尚可使用。其它感染症需無其它治療方案才可使用。

哺乳用藥：若是單次劑量治療法，治療效益遠超過哺乳嬰兒，可以在治療藥物完全由母體清除後或已達到很低的濃度時哺乳。若是分次劑量，藥物的特性顯示可能會給哺乳嬰兒帶來臨床毒性，因此不建議哺乳。

注意事項：

1. 服用本藥前有下列事項請告知醫師：懷孕或哺乳、曾有藥物過敏、其他疾病（如血液、肝疾病、**Crohn's Disease**）或同時服用它種藥物（如抗凝血藥、戒酒藥、抗癲癇藥等）。讓醫師決定是否應用藥。
2. 治療期間即使感染症狀消失，不可擅自停藥，仍需繼續使用，完成整個療程才能根治。否則可能會復發。
3. 服藥期間不可飲用酒精飲料，以免引起噁心嘔吐、腹部痙攣、頭痛、流汗、面部潮紅等不適。
4. 若是生殖道感染，性伴侶應一併接受治療（即使尚未有症狀）。除非醫師特別指示，請勿局部灌洗。在未治癒前應避免性交（若確有性交請使用保險套）。應穿棉質內褲以免病菌滋生。

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快服用。若想起時已經接近下一次服用的時間，則跳過一次，依照原來下一次的服用時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

可能的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

1. 莫名發燒、喉嚨痛或嚴重腹瀉、紅疹、發癢、關節痛。
☞如何處理：請立即停藥並就醫。
2. 舌苔、舌頭刺激、手腳麻木或刺痛、服藥後才發生陰道有分泌物或不適。
☞如何處理：請回診。
3. 噁心、胃口不佳。
☞如何處理：可與食物併服，若未改善請告知醫師。
4. 口乾、金屬味覺。
☞如何處理：可嚼食無糖口香糖。
5. 排尿時有疼痛灼熱感、膀胱刺激、排尿增加、陰道或外陰乾燥、性交困難或疼痛。
☞如何處理：治療結束後就會消失。
6. 尿液呈紅棕色。
☞如何處理：不須特別處理。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 108.01

“喜樂的心，乃是良藥。”（箴言17:22）