



臺安醫院病患用藥指導單

主成份：Non-Steroidal Antiinflammatory Drugs

商品名及含量：

1. Voren Suppository (非炎栓劑)，每粒含 Diclofenac Sodium 12.5 毫克
2. Cataflam Tablet (克他服寧糖衣錠)，每錠含 Diclofenac Potassium 25 毫克
3. Ponstan Capsule (博疏痛膠囊)，每膠囊含 Mefenamic acid 250 毫克
4. PURFEN Tablet (普服芬膜衣錠)，每錠含 Ibuprofen 400 毫克
5. Ibuprofen oral suspension (依普芬痛口服懸液)，
每毫升 20 毫克，每瓶 60 毫升

作用：解熱、鎮痛、緩解發炎反應所引起的症狀。

劑量與用法：

每日服用次數及每次劑量，請遵照醫囑。栓劑太軟時，可置於冰箱30 分鐘或冷水中，但鋁箔包裝不可拆。

孕婦用藥安全：人體試驗顯示在第1孕期及第3孕期使用對胎兒有危險性。

哺乳用藥：

Diclofenac: 現有證據顯示該藥物對哺乳嬰兒不會造成危險。

Mefenamic acid: 現有證據顯示該藥物對哺乳嬰兒不會造成危險。美國兒科醫學會認為可以哺餵母乳。

Ibuprofen: 哺乳期嬰兒不會造成不良的影響

注意事項：

1. 長期使用非類固醇止痛消炎藥者，開始使用三個月內需監測肝、腎功能與糞便潛血反應。
2. 服藥期間應避免喝酒。

3. 有下列情形時，請事先告知醫師：

曾對此類藥過敏或其他藥品過敏；有心衰竭、高血壓、體液滯留、氣喘、胃腸道出血、嚴重血液異常、嚴重肝腎功能障礙、腎臟病等病史的病患；懷孕及授乳期。

4. 不同種類解熱鎮痛藥, 至少間隔1.5-2小時。

忘記服藥時該怎麼辦？

用於解熱、止痛時，如有需要可立即補服。若已接近下次服藥時間則不補服，仍按原時間服藥，不可一次服用雙倍量。

可能的副作用有哪些？ 如果發生了該怎麼辦？

1. 過敏反應如嚴重暈眩、呼吸變快或不規則、心跳變快或不規則、臉部或腳部蕁麻疹腫脹、呼吸困難、胸悶等症狀。

☞如何處理：請立刻至急診就醫

2. 嚴重腹部或胃灼熱或絞痛、黑便、胸痛、癲癇、發燒、不尋常出血。

☞如何處理：請立即就醫

3. 尿液變濁或排尿困難、喉嚨痛、頭痛、黃疸、急速體重增加、眼皮腫。

☞如何處理：請儘速就醫

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 107.6

“喜樂的心，乃是良藥。”（箴言17:22）