

## 藥物：

### 1. Provera Tablet

(普維拉錠)，每粒含有  
Medroxyprogesterone Acetate 5毫克

### 2. Utrogestan Capsule

(優潔通膠囊)，每粒含有  
Micronised Progesterone 100毫克

## 作用：

用於治療無月經症，經痛，荷爾蒙失調引起子宮不正常出血，和雌性素並用可降低子宮內膜癌的危險。

## 劑量與用法：

有兩種不同的用法，請遵照醫囑服用。

1. 用**5~10**天，在月經周期後半段開始用，即第**16**天到**21**天。

2. 每天均使用之。

## 孕婦用藥安全等級：C級

(人體試驗顯示在懷孕第0~16週使用對

胎兒有危險性)，第16週後可以使用

## 哺乳用藥：可以哺乳

## 注意事項：

1. 服用本藥前如有下列事項，請告訴醫師：懷孕或哺乳、糖尿病、血栓疾病或中風、心臟、肝臟、腎臟疾病、乳房或生殖器官的腫瘤、憂鬱、癲癇、偏頭痛、頭痛、骨質疏鬆、高血脂、高血壓、氣喘、原因不明之陰道出血，及同時服用之藥物。

2. 如服此藥後懷孕，馬上告知醫師。

3. 本藥可能導致牙齦腫脹、疼痛、出血，應注意牙齒衛生並按摩牙齦。

4. 如要手術，包含牙科手術。請告知醫師目前在服用此藥。

5. 如有抽煙，請告知醫師。因會增加發生中風、血塊凝集、高血壓的可能。

6. 此藥可能會造成頭昏、昏睡。宜避免開車、操作機械及任何危險之事

## 忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快補服，如果想起時已接近下一次服藥時間，則跳過一次而照計畫服下次量，不可一次服用雙倍劑量。

## 可能的副作用有哪些？

## 如果發生了該怎麼辦？

1. 血栓症狀如嚴重頭痛，偏頭痛，談話、協調性、視力改變或喪失，胸、手、腳麻木或疼痛，不明之呼吸急促。眼睛或皮膚顏變黃。

☞如何處理：請立即就醫。

2. 月經出血量改變、高血糖症候(口渴、尿多)、憂鬱、皮疹、乳汁流量增加或不正常流出。

☞如何處理：請儘速就醫。

3. 腹痛、腳腫、乳房不適、神經質、體重增加、皮膚有黑或褐斑、粉刺、睡眠困擾。

☞如何處理：症狀持續時，請告知醫師。

# 用藥指導

## 黃體素 (Progestins)

**“喜樂的心，乃是良藥。”（箴言17:22）**

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

**藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188**  
**藥劑科編製 100.1**



台安醫院病患用藥教育單張  
台安醫院藥劑部印製