



臺安醫院病患用藥指導單

主成份：Progestins

商品名及含量：

1. Provera Tablet (普維拉錠)，每粒含有Medroxyprogesterone Acetate <MPA>5毫克
2. Progesterone Capsule (婦安蒙膠囊)，每粒含有 Micronised Progesterone 100毫克

作用：

用於治療無月經症，經痛，荷爾蒙失調引起子宮不正常出血，和雌性素並用可降低子宮內膜癌的危險。

劑量與用法：

有兩種不同的用法，請遵照醫囑服用。

1. 用**5~10**天，在月經周期後半段開始用，即第**16**天到**21**天。
2. 每天均使用之。

孕婦用藥安全：

MPA: 孕婦禁止使用。

Progesterone: 人體試驗顯示在懷孕第0~16週使用對胎兒有危險性, 第16週後可以使用

哺乳用藥：哺乳期嬰兒不會造成不良的影響

注意事項：

1. 服用本藥前如有下列事項，請告訴醫師：懷孕或哺乳、糖尿病、血栓疾病或中風、心臟、肝臟、腎臟疾病、乳房或生殖器官的腫瘤、憂鬱、癲癇、偏頭痛、頭痛、骨質疏鬆、高血脂、高血壓、氣喘、原因不明之陰

道出血，及同時服用之藥物。

2. 如服此藥後懷孕，馬上告知醫師。
3. 本藥可能導致牙齦腫脹、疼痛、出血，應注意牙齒衛生並按摩牙齦。
4. 如要手術，包含牙科手術。請告知醫師目前在服用此藥。
5. 如有抽煙，請告知醫師。因會增加發生中風、血塊凝集、高血壓的可能。
6. 此藥可能會造成頭昏、昏睡。宜避免開車、操作機械及任何危險之事

忘記服藥時該怎麼辦？

想起時儘快補服，如果想起時已接近下一次服藥時間，則跳過一次而照計畫服下次量，不可一次服用雙倍劑量。

可能的副作用有哪些？ 如果發生了該怎麼辦？

1. 血栓症狀如嚴重頭痛，偏頭痛，談話、協調性、視力改變或喪失，胸、手、腳麻木或疼痛，不明之呼吸急促。眼睛或皮膚顏變黃。
☞如何處理：請立即就醫。
2. 月經出血量改變、高血糖症候(口渴、尿多)、憂鬱、皮疹、乳汁流量增加或不正常流出。
☞如何處理：請儘速就醫。
3. 腹痛、腳腫、乳房不適、神經質、體重增加、皮膚有黑或褐斑、粉刺、睡眠困擾。
☞如何處理：症狀持續時，請告知醫師。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 107.6

“喜樂的心，乃是良藥。” (箴言17:22)