



臺安醫院病患用藥指導單

主成份：Oseltamivir Phosphate 75毫克

商品名及含量：Eraflu Capsule 易剋冒膠囊
Tamiflu Capsule 克流感膠囊

作用：預防及治療A 型及B 型流行性感冒。

劑量與用法：

(1)治療療程

在流行性感冒症狀出現後2天內開始服用，每天二次，成人或青少年每次需服用75毫克，持續五天的療程。在流行性感冒症狀出現後24小時內開始服用可達到最好的療效。空腹或在餐後服用本藥均可，如感覺腸胃不適(如噁心、嘔吐等)，可與食物併服。

小孩之建議劑量為

體重	建議劑量.(為期5天)	
<=15 公斤	30 毫克	每天 2 次
>15~23 公斤	45 毫克	每天 2 次
>=23~40 公斤	60 毫克	每天 2 次
>40公斤	75 毫克	每天 2次

(2)預防療程：每天一次，持續十天的療程。每次劑量同治療療程

孕婦用藥安全：孕婦感染流感的危險性遠遠超過本藥服用後對胎兒的危險性。建議孕婦可以使用。

哺乳用藥：哺乳期嬰兒不會造成不良的影響

注意事項：

1. 台灣曾有10 歲以上之未成年患者，於服用本藥後發生行為及感覺異常、幻覺、嗜睡或意識障礙等情況。在日本亦有類似案例發生。雖然這些事件與本藥間之因果關係仍未建立，使用期中應特別注意是否發生上述異常行為。對於有相關病史之高風險或已發生上述情況者，應避免使用或停用本藥。
2. 遵照醫師指示服用藥品，不要自行增減劑量；如有腎功能不佳情況，請遵照醫師指示減量。
3. 您需將整個療程的藥品服用完，不可在感覺症狀改善時，即自行停藥，否則體內的病毒可能未清除完全。
4. 應告知醫師自己是否腎功能不全、懷孕或正在授乳。
5. 本藥並不能取代老年人及危險族群每年固定的疫苗接種。
6. 一歲以下之兒童不應給予此藥品。

忘記服藥時該怎麼辦？

如果忘記服藥時，應儘快服用藥品。但若距離下次服藥少於兩小時，則請直接在下一次服藥時間吃藥，不要一次服用兩倍劑量。

可能的副作用有哪些？ 如果發生了該怎麼辦？

1. 疼痛、咳嗽、聲音沙啞、喉嚨痛、頭暈、噁心、嘔吐、鼻塞、流鼻水、失眠；其他您認為是藥品引起的症狀

☞如何處理：告知醫師

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

藥物諮詢專線：(04)2360-2000 轉2188

藥劑科最新修訂日期 106.10

“喜樂的心，乃是良藥。” (箴言17:22)