



## 臺安醫院病患用藥指導單

**主成份：**Macrolides

**商品名及含量：**

Zithromax Tablet (日舒錠)，每粒含有Azithromycin Dihydrate 250毫克

2. Zithromax for Suspension (日舒懸液用粉)，每毫升含有Azithromycin Dihydrate 40 毫克15 毫升/瓶

**作用：**

本類藥是治療細菌感染的抗生素。

**劑量與用法：**

請遵照醫師指示服用。平均分配服藥間隔，固定時間服藥。如果睡覺時無法起床服藥，可以將睡覺時間當一間隔，其餘時間均分。

**孕婦用藥安全：** 人體試驗顯示無危險性

**哺乳用藥：** 哺乳期嬰兒不會造成不良的影響

**注意事項：**

1. 要遵照醫師指示的服藥天數將其服用完，不可擅自停用，否則可能復發。
2. 如有下痢，不可自行服用止瀉藥，請告知醫師。
3. 服用日舒 (Zithromax) 要避免長期曝曬陽光。

**忘記服藥時該怎麼辦？**

想起時儘快服用，若想起時已經接近下一次服藥時間，則跳過一次，依照原來下一次的服用時間服用即可，切勿一次服用兩倍劑量。

**可能的副作用有哪些？**

**如果發生了該怎麼辦？**

1. 皮疹、蕁麻疹、搔癢、呼吸困難、胸痛、心悸、血便、不正常出血或瘀傷、尿液變黑、皮膚或眼睛顏色變黃、嚴重胃痛或其它嚴重不適等症狀。  
☞ 如何處理：請停藥，並立即就醫。
2. 反胃、食慾喪失、噁心、嘔吐、胃抽筋、便秘、特殊味覺、消化不良、糞便變軟、頭痛等。  
☞ 如何處理：情形嚴重或持續時，請告知醫師。

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

**藥物諮詢專線：**(04)2360-2000 轉2188

**藥劑科最新修訂日期** 106.10

**“喜樂的心，乃是良藥。” (箴言17:22)**