

衛署藥製字第 012051 號
衛署藥製字第 024132 號

中國化學

安蒙西林膠囊 250 毫克
500 毫克

Amoxicillin Capsules 250mg
500mg

C.C.P.

網號：B21
B32

Amoxicillin 為半合成的抗生素，安全又具廣效的殺菌作用，為較 Ampicillin 更進步的 Penicillin 同類物。

成分：

每膠囊含有：Amoxicillin Trihydrate
eq. to Amoxicillin 250mg, 500mg(Potency)

優點：

胃酸中安定，所以無須配合進食時間。除了腦部和脊髓液，它都能分佈到大多數的組織與體液。約 60% 在六小時內以原形由尿排出，在血清中有 20% 為蛋白結合態，若同時服用 Probenecid 可延緩其排泄。

適應症：

葡萄球菌，鏈球菌，肺炎雙球菌，腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

效能與用法：

	病原菌種	適應症	用法
上呼吸道感染症	由 Streptococci, Pneumococci, Nonpenicillinase producing Staphylococci, H. influenzae 引起者	中耳炎，鼻竇炎，咽喉炎，扁桃腺炎。	成人： 250mg-500mg 每 8 小時一次 小孩： 20mg-40mg/ 公斤/日， 每 8 小時一次 若小孩體重 達 20 公斤以上， 則依成人劑量投藥， 症狀消除後， 仍宜繼續治療 2-3 天。
生殖泌尿道感染症	由 E. coli, Proteus mirabilis, Streptococcus faecalis 引起者	膀胱炎，腎盂炎，尿道炎。	
皮膚及軟部組織感染症	由 Streptococci, Staphylococci, E. coli 引起者。	癰疽疔瘡，蜂窩狀組織炎，外傷，骨髓炎，心內膜炎，膽囊炎。	

	病原菌種	適應症	用法
下呼吸道感染症	由 Streptococci, Pneumococci, H. influenzae, 引起者	急慢性支氣管炎，肺炎。	成人：500mg 每 8 小時一次 小孩：40mg / 公斤/日，每 8 小時一次 若小孩體重達 20 公斤以上則依成人劑量投藥。
淋病與急性無併發症之泌尿系感染症	由 N. gonorrhoeae 引起者 (男女性皆同)	淋病。	成人：3gm 作單一口服劑量使用，疑有梅毒之淋病患者，須作 Darkfield 檢查，治療後應至少四次按月作血清試驗。

禁忌：對盤尼西林曾有過敏反應者不宜使用。

注意事項：長期治療使用時，須定期作肝臟、腎臟和造血機能檢查。治療期間若復感染黴菌性或細菌性病原時，須適時停藥，再建立新的治療體系。本藥須由醫師處方使用。

副作用：除了對青黴素過敏者外無嚴重的副作用，若有胃腸不適發生，亦極輕微罕見。

貯存：室溫、遮光貯存。

包裝：

250mg 6~1000 粒膠囊瓶裝、PTP 鋁箔盒裝。

500mg 6~1000 粒膠囊瓶裝/盒裝。

賦形劑：

250mg： Magnesium stearate, Talc
硬膠囊：Gelatin, Titanium Dioxide, New Coccine, Sunset Yellow FCF, Sodium Lauryl Sulfate, Glycerine

500mg： Magnesium stearate, Talc
硬膠囊：Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Titanium Dioxide, Sunset Yellow FCF, New Coccine



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL: (02)23124200

台中工廠：台中市工業區 15 路 10 號

