

衛署藥輸字第 023238 號

乳酸菌整腸劑
欣表飛鳴錠
SHIN BIOFERMIN S TABLETS

【特 性】

* 活菌發揮功能的乳酸菌

- 三種乳酸菌(Bifidus 菌, Faecalis 菌, Acidophilus 菌)廣泛地分布於小腸至大腸。



- 產生多量的乳酸及醋酸。



- 減少腸內的有害菌及有害菌產生的有害物質，對整腸頗有助益。

* 容易服用的錠劑

稍有甜味，由兒童至老年人皆容易服用，外觀為白色～略帶淡黃褐色的錠劑。

【成 分】

每錠中含：

有 效 成 分	含 量	作 用
濃縮的 Bifidobacterium bifidum 粉末	2mg	主要分布於大腸，可產生乳酸及醋酸，而提高整腸效果。
濃縮的 Streptococcus faecalis 粉末	2mg	主要分布於小腸，能迅速增殖，使雜亂的腸內菌叢正常化。
濃縮的 Lactobacillus acidophilus 粉末	2mg	主要分布於小腸，可產生大量的乳酸，而抑制有害菌。

其他成分(賦形劑)：Corn Starch, Dextrin, Lactose Hydrate, Precipitated Calcium Carbonate, Maltose Syrup Powder, White Soft Sugar, Talc, Magnesium Stearate

< 小情報：腸內菌叢 >

在腸內約有 100 種 100 兆個細菌團分佈。身體健康的時候，腸內乳酸菌可保持平衡的狀態而發揮良好的作用；當身體不適，或因飲食、環境變化、壓力、高齡化等原因造成劣菌增殖時，腸內的菌叢就會失去平衡，此時必須補充乳酸菌以保持正常的狀態。

【用 途（適 應 症）】

腸內異常發酵、急慢性腸炎、下痢、消化不良、鼓腸、綠便。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

- 1.曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- 1.因其他腸胃疾病，正在接受醫師治療的人。
- 2.正在服用其他藥品的人。
- 3.孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 4.四歲以下孩童。

三、其他使用上注意事項：

- 1.為防止兒童誤食請妥善保管。
- 2.避免陽光直射。
- 3.勿超過建議使用量。
- 4.有發燒症狀時，使用不得超過 48 小時。
- 5.兒童使用時，需有成人協助指導。



【用法用量】

依年齡、症狀得酌量增減。醫師、藥師或藥劑生指示藥品。

15 歲以上	飯後服用，每次三錠，一日三次
5～14 歲	飯後服用，每次二錠，一日三次

說明：飯後服用時，本藥的乳酸菌不受到胃酸影響，以活性的狀態到達腸內，發揮優異的整腸作用。

【警 語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
胃腸道	偶有脹氣

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治


- 1.若有任何不適情況產生。
- 2.連續服用本藥一個月後，若症狀沒有改善。

【包 裝】

18～1000 錠 玻璃瓶裝

【保存及處理上的注意事項】

- 請保存於室溫 25℃。
- 藥品超過使用期限請勿使用。
- 開瓶後請將填充物丟棄(瓶內的填充物是為了防止錠劑在搬運中發生破損，如含有濕氣時，會引起品質變化)。
- 服用後請栓緊瓶蓋(若未栓緊瓶蓋時，藥品易受潮或其他氣味的影響而引起變質)。
- 請勿分裝於其他容器(以避免誤用或引起品質變化)。
- 於外盒及藥瓶的「開瓶日期」記載欄，請填寫開瓶日期。
- 為了保持品質起見，請於開瓶後六個月內服用。



製造廠：表 飛 鳴 製 藥 株 式 會 社
(Biofermin Pharmaceutical Co., Ltd.)

公司地址：日本神戶市長田區三番町五丁目五番地
(5, 5-Chome, Sanbancho, Nagata-ku, Kobe, Japan)

廠 址：日本神戶市西區井吹台東町七丁目 3 番 4
(3-4, 7-Chome, Ibukidai Higashimachi, Nishi-ku, Kobe, Japan)

販 賣：大正製藥株式會社
日本東京都豐島區高田 3 丁目 24 番 1 號

藥 商：台灣大正製藥股份有限公司
台北市長安西路 180 號 4 樓之 1

電 話：(02) 2558-1204