

“生達”必舒咳[®] 錠 12毫克(布朗信) **Bisco** Tablets 12mg (Bromhexine)

成分：

有效成分及含量：每錠中含有：

Bromhexine Hydrochloride.....12mg

其他成分(賦形劑)：

Lactose Monohydrate、Potato Starch、Tartrazine、Polyvinylpyrrolidone K-30、Sodium Saccharin、Water Purified、Magnesium Stearate、Sodium Starch Glycolate、Aerosil

用途(適應症)：

氣管支氣管炎、支氣管炎性氣腫、塵肺症、支氣管擴張所導致之咯痰困難症。

使用上注意事項：

- 一、有下列情形者，請勿使用
 - (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治。
 - (一) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。
 - (二) 3歲以下。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生。
 - (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項
 - (一) 據動物實驗報告，經長期間給予大量連續服藥時，肝功能指數(Serum transaminase Value)會上升。
 - (二) 咳痰量會暫時增加，神經質的人可能會有不安感。
 - (三) 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
 - (四) 避免陽光直射。
 - (五) 勿超過建議使用量。
 - (六) 不得與含酒精飲料併用。

用法用量：

每次使用劑量	每日使用次數
1錠	3次

警語：

- 一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

部位	症狀
胃腸	噁心、食慾不振、胃部不舒服、腹痛等
精神、神經系統	頭痛

- 二、服用本藥後，若有發生以下症狀，請立即停止使用，並接受醫師診治

- (一) 出現發疹等過敏症狀時。
- (二) 若有任何不適情形產生。
- (三) 咳出來的痰有血。

包裝：

6-1000粒塑膠瓶裝

類別：

醫師藥師藥劑生指示藥品

貯藏條件：

25℃以下貯存。

置於小孩接觸不到之處

衛署藥製字第025121號

Code No.TB-05 2211120



PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司

STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

台南市新營區土庫里土庫6之20號