

105.0 mm

250.0 mm

抗焦慮劑

怡必隆 錠 5 毫克 衛署藥製字第 G-5408 號
040134

怡必隆 錠 10 毫克 衛署藥製字第 G-5237 號
039778

Sepirone Tablets 5 mg

Sepirone Tablets 10 mg

[說明]

Buspirone 是一種抗焦慮劑，其化學結構式和藥理作用均不同於 Benzodiazepine、Barbiturate，或其他鎮靜、安眠劑，口服後可改善憂鬱患者的症狀，較少發生生理或心理的依賴性及禁戒症候群。

[作用]

Buspirone 抗焦慮的詳細作用機轉，仍有待進一步證實，與 Benzodiazepine 不同的是其無抗痙攣或肌肉鬆弛作用；此外，其亦缺乏其他抗焦慮劑的顯著鎮靜作用。臨床前的研究顯示 Buspirone 對 A 型血清促進素 (Serotonin) 受體 (5-HT 1A) 具有很高的親和力，對 Benzodiazepine 受體則無親和力；此外並不影響 GABA 的結合。

[成分] 每錠中含有

Buspirone Hydrochloride (5 mg 或 10mg)。

[適應症]

焦慮狀態。

[用法·用量]

建議起始劑量為每天三次，每次 5 mg (每天 15 mg)；而後可依需要，以 2~3 天的間隔，每天增加劑量 5 mg。每日最高劑量勿超過 60 mg。本藥須由醫師處方使用。

[禁忌]

1. 對本品有過敏性患者。
2. 與單胺氧化酵素抑制劑 (MAOI) 併用。
3. 由於本品不具有抗精神病作用，所以勿用於治療精神病患者。

[注意]

1. 雖然研究顯示：Buspirone 的鎮靜作用較其他抗焦慮劑低，且不會造成顯著的功能損傷，但它的中樞神經作用，對個別患者的影響是不可預期的，因此，患者應小心地駕車或操作複雜性機械，直到確定 Buspirone 不影響患者為止。
2. 由於 Buspirone 與 Benzodiazepine、其他鎮靜/安眠劑間無交叉耐受性，所以其將無法阻斷上述藥物的禁戒症候群；因此在 Buspirone 起始治療前，應先建議患者逐漸地停用先前使用的治療劑。
3. Buspirone 對孕婦與授乳婦女的使用安全性尚未確定，所以孕婦與授乳婦女在使用本品前，應先評估使用藥品的利與弊。
4. 因為 Buspirone 在肝臟代謝，經腎臟排泄，所以嚴重肝或腎病患者使用時，應特別小心。

[藥品相互作用]

因為 Buspirone 對併用的藥物所產生的交互作用尚未確定，因此 Buspirone 與其他中樞作用藥物併用時應小心。

[副作用]

常見的副作用為頭暈、噁心、頭痛、神經質與興奮。

[身體與心理依賴性]

在人體與動物的研究中發現：Buspirone 無濫用的潛在性，且亦無證據顯示，其會引起耐受性或身體或心理依賴性。儘管如此，醫師仍應小心觀察曾有濫用藥物病史患者的用藥情形。

[貯存條件]

請密蓋置於室溫 (15~30℃) 下貯存。

[賦形劑]

Avicel PH 101, Spray Dried Lactose, Aerosil 200, Primojel, Magnesium Stearate

[包裝]

4~1000 錠，塑膠瓶裝；鋁箔盒裝。

委託者：健喬信元醫藥生技股份有限公司

303 新竹縣湖口鄉工業一路 6 號

製造廠：優良化學製藥股份有限公司

303 新竹縣湖口鄉中興村光復路 10 號

SLT8001R-04

此為文件說明 請勿印刷

Version number	SPR5&10-CI-2015.10.14
Revision date	14/10/2015
Dimensions (mm) Width * Height * Depth	105.0 x 250.0

摺後尺寸 62.5 x 105.0 mm