



祛痰劑

KTT-004
衛署藥製字第28142號

“永信”

痰可出

錠 375公絲

(卡玻西典)

Kasteine

(S-Carboxymethylcysteine)

Tablets 375mg
"Yung Shin"

咳嗽是人體正常的反應，尤其是呼吸道黏膜受到刺激或感染時最為常見。咳嗽又分無痰的乾咳及有痰的濕咳，其中又以濃稠的痰液最不易咳出也最令人感到不舒服。本藥即為一祛痰劑，適時地給予能降低濃痰黏稠度而輕易地將痰液咳出並改善呼吸道不適症狀。

【作用】

1. Carbocysteine可藉由破壞Mucoprotein（粘性蛋白）之雙硫鍵而溶解濃稠痰液，並藉降低分泌物之粘稠度而促進痰液的咳出。
2. 本藥能調整呼吸道粘膜及分泌物之正常化，因而保護呼吸道及維持其暢通性。

【成分】

有效成分及含量：每錠中含：S-Carboxymethylcysteine.....375mg
其他成分（賦形劑）：Hydroxypropyl cellulose、Polyvinylpyrrolidone、Sodium Starch Glycolate、Talc、Magnesium Stearate、Colloidal Silicon Dioxide。

【用途（適應症）】

減少呼吸道粘膜分泌的粘稠性。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 1. 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 1. 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾（慢性支氣管炎、肺氣腫）所引的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。
 2. 有潰瘍或十二指腸潰瘍的人。
 3. 2歲以下。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 1. 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量。
 4. 不得與含酒精飲料併用。

【用法用量】

年齡	使用量
成人及12歲以上	一次2錠，一日3次，飯後服用
5歲以上未滿12歲	每次1/2~1錠，一日3次，飯後服用
2歲以上未滿5歲	每次1/3錠，一日4次，飯後服用
2歲以下	請洽醫師診治

【警語】

- 一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治
 1. 若有任何不適情況產生。
 2. 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。

【包裝】

2~1000錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25°C以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

【給痰液不易咳出患者的治療建議】

1. 多喝熱水或飲料，稀釋痰液以利咳出。
2. 少食用甜份太高的食物或飲料而增加痰液粘稠度。
3. 避免服用含辛辣或刺激性成分之食物或飲料。
4. 儘量在濕度高的溫暖房間，以稀釋支氣管中的痰。
5. 定時服藥、多休息以利病情早日痊癒。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號



2144948