



“永信”

喜復黴素

衛署藥製字第045699號
Code No.:32093

膠囊100公絲

Cefixmycin

Capsules 100mg "Yung Shin"

Cefixmycin是一種口服Cephem類抗生素，其一般名稱爲Cefixime，在7-Aminocephalosporanic acid的第3位有Vinyl基，在第7位有 Carboxymethoxymino基。

本劑和以往的Cephem劑、Penicillin劑相異，對各種β-Lactamase安定，具有對革蘭氏陽性、陰性菌廣範圍的抗菌範圍，特別對於革蘭氏陰性桿菌，能發揮優異的抗菌作用，其作用是殺菌的。口服後約4小時，達到最高血中濃度，有效血中濃度之持續長久，並可達到高的膽汁中濃度，尿中排泄也是持續性的，1日口服2次，可期待其有效性。

Cefixime對於膽管炎、膽囊炎及猩紅熱有治療的效果。

【成分】每膠囊中含：
Cefixime 100mg (potency)

【賦形劑】Pregelatinized Starch、Calcium Phosphate Dibasic 2H₂O、Magnesium Stearate、Microcrystalline Cellulose、Colloidal silicon dioxide、Capsule #4 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF)。

【適應症】Streptococcus spp., S.pneumoniae, N.gonorrhoeae, Branhamella catarrhalis, E. coli, Klebsiella spp., Serratia spp., Proteus spp., H. influenzae菌當中，由Cefixime感受性菌引起之下述感染症：
支氣管炎、支氣管擴張症（感染時）、慢性呼吸系疾病的繼發性感染、肺炎、腎盂腎炎、膀胱炎、細菌性尿道炎、中耳炎、副鼻竇炎。

【用法、用量】本藥須由醫師處方使用。
通常，對於成人及體重30kg以上的小兒，以Cefixime，1次50～100mg（力價），一日口服2次。但可依年齡、體重、症狀適宜增減之。重症或推測效果不彰之病例，以Cefixime，1次200mg（力價），一日口服2次。

【關於用法、用量，使用上之注意事項】1. 為防止細菌產生抗藥性，使用本藥時應先確認爲感受性細菌，治療也以採用最短療程爲原則。
2. 重度腎障礙之患者因血中濃度會蓄積，應視腎臟損害程度而降低劑量或調整給藥間隔時間（請參考「藥物動態」）。

【使用上之注意事項】1. 下列患者請勿給藥
有過因本藥之成分而引起休克病史之患者。
2. 原則上，下列患者請勿給藥，但是有特別必要時，應慎重給藥
對本藥之成分或Cephem類抗生素有過敏病史之患者。
3. 下列患者應慎重給藥
・對Penicillin類抗生素有過敏病史之患者。
・本人、父母或兄弟姊妹有易發支氣管氣喘、發疹、蕁麻疹等過敏體質之患者。
・有重度腎障礙之患者。（請參考「關於用法、用量，使用上之注意事項」及「藥物動態」。）
・不能正常進食之患者或非經口攝取營養之患者、全身狀態不良之患者（因可能會出現維他命K缺乏症狀，故須嚴密觀察。）
・老年人（請參考「對老年人的給藥」）。
4. 重要之基本注意事項
可能有出現休克之虞，故須詳細問診。
5. 相互作用
併用時之注意事項

藥劑名等	臨床症狀・處置方法	機轉・危險因子
Warfarin	有增強Warfarin的作用之虞，但並無本劑關聯性之病例報告	會抑制腸內菌產生維他命K

6. 副作用
總病例數12,879例中包含實驗室檢查值異常，有副作用的有294例(2.28%)；其副作用症狀爲腹瀉等的消化系統症狀112例(0.87%)，發疹等的皮膚症狀29例(0.23%)，此外實驗室檢查值異常爲GPT上昇78例(0.61%)，GOT上昇58例(0.45%)，嗜伊紅性白血球增多26例(0.20%)等。
(1)主要的副作用
・休克：曾出現休克（低於0.1%）的情況，故仍須嚴密觀察。當出現不適感、口內異常感、喘鳴、眩暈、便秘、耳鳴、發汗等症狀時，須中止給藥並採取適當處理。
・類過敏性休克症狀：曾出現類過敏性休克症狀（呼吸困難、全身潮紅、血管浮腫、蕁麻疹等）（低於0.1%）的情況，故須嚴密觀察，若有出現不適時，應中止給藥並採取適當的處理。
・皮膚障礙：曾出現皮膚黏膜眼症候群（Stevens-Johnson症候群，低於0.1%），中毒性表皮壞死症（Lyell症候群，低於0.1%），故須嚴密觀察，當認定有發熱、頭痛、關節痛、皮膚或黏膜的紅斑、水泡，皮膚的緊張感、灼熱感、疼痛的情況時，須中止給藥並採取適當的處理。
・血液障礙：曾出現無顆粒性白血球症（低於0.1%，初期症狀：發熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感等）。溶血性貧血（低於0.1%，初期症狀：發熱、Hemoglobin尿，貧血症狀等），血小板減少（低於0.1%，初期症狀：點狀出血、紫斑等）情況；此外，其他的cephem類藥劑曾有血球減少的報告，故須進行定期檢查等嚴密的觀察，當認定有異常時，須中止給藥並採取適當的處理。
・腎障礙：曾出現急性腎衰竭等之嚴重腎功能障礙（低於0.1%），故須進行定期的檢查等嚴密的觀察，當認定有異常時，須中止給藥，並採取適當的處理。
・大腸炎：曾伴有偽膜性大腸炎等血便的嚴重大腸炎的情況出現（低於0.1%）。當有腹痛、頻繁的腹瀉時，須採取立即中止給藥等適當之處理。
・間質性肺炎，PIE症候群：曾伴有發燒、咳嗽、呼吸困難、胸部X光異常、嗜伊紅性白血球增多等間質性肺炎、PIE症候群（分別低於0.1%）的情況出現。當有這類症狀出現時，須採取中止給藥，並進行給與副腎皮質荷爾蒙劑等適當處理。

	0.1～低於5%	低於0.1%
過敏症（註）	發疹、蕁麻疹、紅斑	搔癢、發熱、浮腫
血液	嗜伊紅性白血球增多	顆粒性白血球減少
肝臟	GOT上昇，GPT上昇，A1-P上昇	黃疸
腎臟		BUN上昇
消化系統	腹瀉、胃部不適感	噁心、嘔吐、腹痛、胃灼熱、食慾不振、腹漲感、便秘
菌交替症		口內炎、念珠菌症
維他命缺乏症		維他命K缺乏症狀（低凝血酶原血症、出血傾向等），維他命B群缺乏症（舌炎、口內炎、食慾不振、神經炎等）
其他		頭痛、眩暈

（註）發現此症狀時，須中止給藥並採取適當處理。
7. 對老年人的給藥
注意以下事項，並注意用量及給藥間隔，觀察患者狀態，謹慎給藥。
(1)患有生理機能低下的老年人很多，易發現副作用。
(2)老年人易出現維他命K缺乏症狀。

“永信”

喜復黴素

膠囊100公絲

Cefixmycin

Capsules 100mg "Yung Shin"

CKC-005

2151774



- 對孕婦、產婦、餵乳婦的給藥
有關懷孕中給藥的安全性尚未確立，所以在孕婦或可能懷孕的婦女，限於判斷其治療上的有益性超越危險性時，才可給藥。
- 對小兒的給藥
對新生兒和早產兒之安全性尚未確立（沒有使用經驗）。
- 對實驗室檢查值的影響
(1)試紙試驗法(Test-tape)除外，用Benedict試藥、Fehling試藥及Clinitest作尿糖檢驗時，可能會出現偽陽性，故須加注意。
(2)直接Coombs檢驗時，可能會出現陽性反應，故須加注意。
- 應用時之注意事項
(1)在發給藥品時：指導患者由鋁箔包裝中取出後服用（根據報告揭載，若誤食鋁箔包裝，尖硬部分會刺入食道黏膜中，更進一步會穿孔而引起腸膜炎等的嚴重併發症）。
(2)在發給給粒時：須注意不要在牛乳、果汁內等任憑懸濁放置。
- 其他
在幼小小白鼠1000mg/kg以上的藥量經口給藥的試驗，曾有發現抑制精子形成作用的報告。

【藥效藥理】1. 抗菌作用
・具革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌廣泛的抗菌範圍，特別對於革蘭氏陽性菌之Streptococcus spp., (enterococcus除外) S. pneumoniae，革蘭氏陰性菌之N. gonorrhoeae, Branhamella Catarrhalis, E. coli, Klebsiella spp., Serratia spp., Proteus spp., H. influenzae等，抗菌力也比其他的口服Cephem劑強，其作用形式是殺菌的。
・由於對各種細菌產生的β-Lactamase極為安定，所以對β-Lactamase產生菌也有優異的抗菌力。
2. 作用機轉
作用機轉爲阻止細菌細胞壁之合成，其作用點雖因菌種不同而異，但是和Penicillin結合蛋白(PBP)的1(Ia, Ib, Ic)及3有強力的親和性。


【藥物動態】1. 血中濃度
(1)正常人空腹時1次口服50，100，200mg（力價），約4小時後可達到最高血中濃度，分別是0.69，1.13，1.95μg/mL，血中濃度半衰期爲2.3～2.5小時。腎功能正常的小兒患者1次口服1.5，3.0，6.0mg（力價）/kg時，約3～4小時後可達到最高血清中濃度，分別是1.14，2.01，3.97 μg/mL，血中濃度半衰期爲3.2～3.7/小時。
(2)比較單次服用Cefixime 100mg的中度腎功能障礙組(30 ≤ Ccr < 60mL/min，n=3)及高度腎功能障礙組(10 ≤ Ccr < 30mL/min，n=4)；其尖峰值顯示，中度障礙組在投藥6小時後爲2.04 μg/mL，高度障礙組在投藥8小時後爲2.27 μg/mL，12小時後的血清濃度分別爲0.71 μg/mL，1.83 μg/mL之後的高度障礙組其濃度仍持續；半衰期分別爲4.15小時及11.05小時。
2. 組織滲透性
對患者痰液、扁桃組織、上頰竇黏膜組織、中耳分泌物、膽汁、膽囊組織等之滲透性良好。
3. 代謝
在人體的血清中、尿中，沒有抗菌代謝物。
4. 排泄
主要由腎臟排泄，正常人（空腹時）口服50，100，200mg（力價）時的尿中排泄率（0～12小時），約20～25%，最高尿中濃度分別是42.9（4～6小時），62.2（4～6小時），82.7 μg/mL（4～6小時）。此外，腎功能正常的小兒患者，口服1.5，3.0，6.0mg（力價）/kg時的尿中排泄率（0～12小時），約13～20%。

【臨床應用】臨床效果
在日本，1,467例的一般臨床試驗結果概要如下。此外，在一般臨床試驗1日使用量，成人以200mg（力價）（分2次），小兒則以3.0～9.9mg（力價）/kg（分2～3次）為主。
另外，在4種雙盲試驗（支氣管炎、肺炎、複雜性尿路感染症、中耳炎），認定本劑的有效性。

呼吸系統感染症	疾病名稱		有效例 / 病例數	有效率(%)
	支氣管炎	急性支氣管炎	118 / 140	84.3
		慢性支氣管炎	87 / 121	71.9
	支氣管擴張症の感染時		29 / 41	70.7
	慢性呼吸系疾病の繼發性感染		29 / 42	69.0
尿路感染症	肺炎		118 / 136	86.8
	腎盂腎炎		84 / 107	78.5
	膀胱炎		407 / 503	80.9
	淋菌性尿道炎		93 / 101	92.1
膽道感染症	膽囊炎		18 / 19	94.7
	膽管炎		20 / 30	66.7
	猩紅熱		37 / 37	100.0
耳鼻咽喉科感染症	中耳炎		116 / 150	77.3
	副鼻竇炎		30 / 40	75.0
合 計		1186 / 1467	80.8	

【性 狀】1. 製劑之性狀：Cefixmycin膠囊100mg，之性狀如下表：

種類	膠囊顏色	YSP code	膠囊號數	膠囊號數
膠囊100mg	乳橘色	乳橘色	4號	約0.16g

2. 有效成分之理化學性質。
結構式

學 名：Cefixime
(WHO recommended INN: Cefixime)
化學名：(一)-(6R, 7R)-7-[(Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(carboxymethoxymino) acetamido]-8-oxo-3-vinyl-5-thia-1-azabicyclo [4.2.0] oct-2-ene-2-carboxylic acid
分子式：C₁₆H₁₅N₅O₇S₂，分子量：453.46，熔點：約240°（分解）
Cefixime爲白色～淡黃色之結晶性粉末，無臭或有極淡之特異臭味，易溶於甲醇(Methanol)，微溶於乙醇(Ethanol)，幾不溶於水、乙醚(Ether)。

【保存上之注意】1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 25℃以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包 裝】2～1000粒鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地 址：台中市大甲區中山路1段1191號

電 話：（04）26875100

台中幼獅三廠：台中市大甲區日南里工六路26號