


“信東” 賜福力欣 膠囊

Cephalexin Capsules “TBC”

Cephalexin是由頭孢子菌素 (Cephalosporin C) 衍生而來之半合成
抗生素，其構造為8元之 β -lactam-dihydrothiazine Ring為骨架，異於
Penicillin 7元之 β -lactam-thiazolidine Ring構造式如下：



Cephalexin為單結晶水之白色晶形粉末，其作用機序類似Penicillin之抑制
細菌胞壁之Mucopolysaccharide合成Penicillinase不影響其作用，是廣效性之抗生素
，不受酸之作用，口服易吸收血中濃度（口服250mg）可達4.5~6.8mcg/ ml
分佈很廣，如體液、肺、脾、肝、胰臟、心臟、胃壁、腹膜、盲腸、膽囊、
陰道、腎臟等。口服後約90%不改變分子型式由尿中排出體外。

對Gram（+）、Gram（-）菌，如化膿性鏈球菌、肺炎雙球菌、白喉桿
菌、草綠色鏈球菌、大腸菌、肺炎克雷白氏菌、奇異變形桿菌、流行性感
嗜血桿菌、淋病雙球菌、腦膜炎雙球菌、沙門氏菌及志賀氏菌屬等皆有效。

【成 分】

主成分：Each capsule contains：

Cephalexin.....500mg(Potency)

賦形劑：Magnesium Stearate、Capsule Shell(含Gelatin、Sodium Lauryl
Sulfate、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide、Tartrazine)。

【適 應 症】

葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起
之感染症。

【作 用】

有感受性細菌所引起之泌尿生殖道、呼吸道、柔組織及皮膚等感染症。如
急性慢性腎盂炎、前列腺炎、咽喉炎、中耳炎、外耳炎、扁桃腺炎、鼻竇炎、
肺炎、支氣管炎、丹毒、蜂窩組織炎膿腫、淋巴腺炎、膿性皮炎、青黴素不
適用之淋病、骨、關節炎、骨髓炎、風濕性心臟病。

【注 意】

服用本劑後，可能有假性糖尿反應，可用Clinistix試劑則不生此現象，青
黴素過敏患者Cephalexin有好之耐受性，應注意其交互過敏反應，腎機能降
低時應減量服用，孕婦應謹慎使用，避光貯存30°C以下。

【用法·用量】

口服：成人一次250~500mg，每6小時一次。

小孩一天25~50mg/kg分四次使用。

本藥須由醫師處方使用。

【包 裝】

1000粒以下瓶（盒）裝。

衛署藥製字第015660號



信東生技股份有限公司 觀音廠

桃園市觀音區國建一路1號

54031359③

