

香蕉口味“晟德”

勝克敏液

1 毫克/毫升

Cetirizine Oral Solution 1mg/ml “Center”

GMP
衛署藥製字第 044023 號
G-7263

主 成 分：每毫升(ml)含有
Cetirizine Dihydrochloride 1.0 mg

適 應 症：
季節性鼻炎、過敏性鼻炎、結膜炎、蕁麻疹、過敏性搔癢等過敏現象。

用法用量：本藥須由醫師處方使用
成人及 3 歲以上孩童適用。
成人及 6 歲以上孩童：每次 10 毫克(即 2 匙)，一天一次，於晚餐時與液體併服。
3~6 歲孩童：一天一次，每次 5 毫克(即 1 匙)，於晚餐時服用。或分別於早、晚各服用 2.5 毫克(即半匙)。
10 毫克(= 2 匙) = 10 毫升
5 毫克(= 1 匙) = 5 毫升
2.5 毫克(= 1/2 匙) = 2.5 毫升
腎功能不全的患者服用本藥時，其劑量應減半。

特 性：
Cetirizine 為 Anti-H1 之抗過敏治療劑，且無明顯的 Anti-Cholinergic 及 Anti-Serotonin 作用。
在有效劑量內 Cetirizine 不會通過腦血管障壁，對中樞神經沒有作用，不會產生安眠及行為異常等現象。

Cetirizine 的作用：
1.迅速抑制外生性組織胺。
2.對內生性組織胺的釋出有抑制作用(如 48/80 之組織胺)。
3.抑制由 VIP(Vasoactive Intestinal Polypeptide)和 Substance P 所引起之過敏反應。
4.抑制初期皮膚過敏反應時，組織胺介質的作用。
5.明顯抑制發炎性細胞(例如 eosinophils)的移動，而降低遲發性皮膚過敏反應的介質釋放。
6.顯著的降低氣喘患者的支氣管對組織胺的過度反應。
7.降低由特殊過敏原引起的過敏反應。
這些作用，由心智測驗及 Quantified EEG 得知，對中樞神經不會產生任何作用。

藥物動力學：
口服 Cetirizine 1 小時內，會達血中最高濃度。
血漿半衰期成人約為 10 小時，6~12 歲的孩童約為 6 小時，3~6 歲的孩童約為 5 小時。
成人及孩童的蓄積腎排泄量(cumulative urinary excretion)約為投藥量的三分之二。
通常孩童的血漿清除率要比成人為高。
Cetirizine 的吸收並無個體差異。體內血漿濃度與投藥量成線性關係。
Cetirizine 與血漿蛋白具有很強的結合力。

禁 忌 症：
對主成分過敏者禁用。

副 作 用：
曾有報導顯示會發生輕微、短暫的主觀性副作用，例如：頭痛、眩暈、嗜眠、精神激昂、口乾、胃腸不適。但由精神運動性(psychomotor)的客觀性功能試驗結果來看，Cetirizine 的鎮靜作用發生率與安慰劑的效果相似。Cetirizine 的過敏性徵狀極少被報導。

孕婦及授乳婦：
動物實驗中，尚無引起不良反應之報告。但孕婦應避免使用本藥。
Cetirizine 會被排泄至乳汁中，因此授乳婦不可使用本藥。

藥物交互作用：
至今尚未有藥物交互作用方面的報告，但若同時服用鎮靜劑者，請謹慎使用。本藥應避免與過量的酒精併服。

開車或操作機械：
實驗證明，對正常人授予每天 20~25 毫克的劑量，不會影響警覺及反應時間。但從事駕駛及操作機械者，請小心使用，儘量不要過量服用。

注意事項：
在治療劑量下，Cetirizine 不會加重酒精(血中酒精濃度為 0.8g/L 時)的作用，但應避免。

過 量：
單次劑量超過 50 毫克/(50 毫升)時，會有安眠的症狀發生，無特殊之解毒劑。如有此現象發生，請儘快以灌腸法及一般急救法處理。

賦 形 劑：Sucrose, Sodium Benzoate, Methylparaben, Banana Essence, Sodium Citrate, Citric Acid Anhydrous, Water Purified

包 裝：20~4000 毫升塑膠瓶裝

儲 存：
(1)本品應置於兒童不及之處。
(2)請密封儲存於 25℃以下，毋須冰存並避免陽光直射。

安 定 性：
請注意包裝上所標示的有效期限。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地 址： 臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠 址： 新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話： (02) 2655-8680 圖文傳真： (02) 2655-8380

工廠電話： (03) 598-1829 圖文傳真： (03) 598-1820