



華興製藥

痛風發作之緩解藥

「華興」可爾信 錠 Conicine Tablets "H.S."

衛署藥製字第 09987 號

【成分】

每錠含：Colchicine.....0.5mg

【賦形劑】

Lactose、Starch、Magnesium Stearate、Talc、Tartrazine、Brilliant Blue FCF、Polyvinyl Pyrrolidone K-90。

【適應症】

痛風。

【用法用量】

由於兒童及青少年療效及安全性尚未建立，不建議使用於兒童及青少年。

預防痛風發作

一般成人及大於 16 歲青少年預防痛風發作的劑量為 0.5mg，每天 1-2 次。最大建議劑量為 1mg/天。

治療痛風發作

(1) 痛風發作時的最初劑量為 1mg，然後一個小時後再服用 0.5mg，或 0.5mg 一天 3 次，最大劑量 1.5mg。第二天以後 0.5mg 每天 1-2 次直到發作症狀緩解。重複療程需間隔至少 3 天。

(2) 原本已使用 colchicine 預防痛風發作的患者，若有必要亦可將 colchicine 用於治療痛風發作，劑量為 1mg，然後一個小時後服用 0.5mg。等待 12 小時後恢復預防痛風發作時的劑量。

腎功能不全患者之劑量調整

1. 預防痛風發作：

用於預防輕中度腎功能不全患者（肌酸酐清除率【Clcr】30-80mL/min）的痛風發作，無需調整劑量，惟應密切監控用藥期間之不良反應情形。然而，用於嚴重腎功能不全的患者（肌酸酐清除率【Clcr】<30mL/min），起始劑量應為每日 0.25mg，如需調高任何劑量，均應進行密切監測。用於透析患者預防痛風發作，起始劑量應為每週兩次給予 0.25mg，並進行密切監測。

2. 治療痛風發作

用於輕中度腎功能不全患者（肌酸酐清除率【Clcr】30-80mL/min）痛風發作，無需調整劑量，惟應密切監控用藥期間之不良反應情形。然而，用於嚴重腎功能不全的患者（肌酸酐清除率【Clcr】<30mL/min），雖然不需調整其治療劑量，但每兩週至多只能重複一次療程，若需要多次重複療程，應考慮其他替代療法。用於治療透析患者的痛風發作，建議劑量為單次投予 0.5mg，且重複療程需至少間隔 2 週。

在腎功能不全病人已使用 colchicine 作為預防痛風發作使用，則不建議再使用 colchicine 作為痛風發作治療之用。

肝功能不全患者之劑量調整

1. 預防痛風發作：

用於預防輕度至中度肝功能不全患者痛風發作，無需調整劑量，惟應密切監控用藥期間之不良反應情形。但用於預防嚴重肝功能不全患者痛風發作，則應考量調低劑量。

2. 治療痛風發作：

用於輕度至中度肝功能不全患者的痛風發作，無需調整劑量，惟應密切監控用藥期間之不良反應情形。然而，用於治療嚴重肝功能不良患者之痛風發作，雖然不需調整其治療劑量，但每兩週至多重複一次療程，若需要多次重複療程，應考慮其他替代療法。

在肝功能不全病人已使用 colchicine 作為預防痛風發作使用，則不建議再使用 colchicine 作為痛風發作治療之用。

Colchicine 併用其他交互作用藥品之劑量調整

曾有肝或腎功能不全之患者使用 colchicine 引起嚴重或是死亡的藥品交互作用之案例。

使用 colchicine 前 14 天內曾使用強效、中效 CYP3A4 抑制劑或 p-glycoprotein 抑制劑須進行劑量調整（如表 1）。

表 1：Colchicine 併用其他交互作用藥品之劑量調整

併用強效 CYP3A4 抑制劑（如：Atazanavir、Clarithromycin、Indinavir、Itraconazole、Ketoconazole、Nefazodone、Nelfinavir、Ritonavir、Saquinavir、Telithromycin）		
	原本劑量	調整劑量
預防痛風發作	0.5mg，一日 1-2 次。	0.25mg，每天或每隔天使用一次。
治療痛風發作	先 1mg，1 小時後再給予 0.5mg，重複療程需間隔至少 3 天。	先 0.5mg，1 小時後再給予 0.25mg，重複療程需間隔至少 3 天。
併用中效 CYP3A4 抑制劑（如：Amprenavir、Aprepitant、Diltiazem、Erythromycin、Fluconazole、Fosamprenavir、Grapefruit Juice、Verapamil）		
預防痛風發作	0.5mg，一天 1-2 次。	0.25mg，一天 1-2 次或 0.5mg，一天 1 次。
治療痛風發作	先 1mg，1 小時後再給予 0.5mg，重複療程需間隔至少 3 天。	單次給予 1mg，重複療程需間隔至少 3 天。
併用 P-gp 抑制劑（如：Cyclosporine、Ranolazine、Amiodarone）		
預防痛風發作	0.5mg，一天 1-2 次。	0.25mg，每天或每隔天使用一次。
治療痛風發作	先 1mg，1 小時後再給予 0.5mg，重複療程需間隔至少 3 天。	單次給予 0.5mg，重複療程需間隔至少 3 天。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

- 一、若有虛弱、厭食、噁心、嘔吐或下痢現象時，需減少劑量。
- 二、對懷孕婦女可能造成胎兒的傷害；懷孕用藥級數：D 級。
- 三、授乳期是否會分泌母乳中，尚未確立。
- 四、兒童安全性及有效性尚未確立。
- 五、老年人及衰弱病患；尤其是患有肝、腎、腸胃或心臟疾病患者需小心使用。
- 六、可能改變週腸黏膜功能而引起可逆性 Vitamine B12 吸收不良。
- 七、增加中樞神經抑制劑敏感性和加強擬交感神經作用劑的反應。

【副作用】

- 一、腸胃方面可能出現噁心、嘔吐、腹痛及腹瀉，尤其是使用高劑量。
- 二、長期使用可能造成骨髓抑制伴隨再生不良性貧血，顆粒性白血球缺乏症或血小板過低症；周邊神經炎、掉髮也曾被報導過。
- 三、在一般投與劑量下，也曾發生肌病變，尤其是腎衰竭者。

【禁忌】

- 一、對 Colchicine 過敏患者。
- 二、嚴重胃腸、腎、肝或心臟疾病患者。

【儲存】

儲存於 25°C 以下。

【包裝】

12-1000 錠瓶裝及鋁箔盒裝。

本品代號：Conicine 003

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉鵝平村四維巷 128 號

服務專線：(04)8832121~6