

130.00 mm

鳳梨口味

“晟德”

希普利敏液

0.4毫克/毫升

Cypromin Solution

0.4mg/ml "Center"

GMP  
衛署藥製字第 043588 號  
G-6985

主成份：每毫升(ml)含有

Cyproheptadine Hydrochloride .....0.4 mg

適應症：

皮膚疾患引起之搔癢(濕疹、皮膚炎、皮膚搔癢症、藥物過敏反應)枯草熱、蕁麻疹、過敏性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒支氣管炎引起之咳嗽、鼻涕。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

成人：治療範圍一般每天10~50毫升，大部分病患用量為每天30~40毫升，視病情可加重至每天80毫升，建議初使用者每日3次，每次10毫升，每天最多不超過0.5 mg/kg體重。

7-14歲孩童：每日2~3次，每次10毫升，每天最多不超過40毫升。

2-6歲孩童：每日2~3次，每次5毫升，每8~12小時一次，每天最多不超過30毫升。

藥理作用：

本藥具有抗乙醯膽鹼和鎮靜的功能，為Serotonin及組織胺的拮抗劑，對一般之過敏反應有療效。

藥物交互作用：

1.本藥與酒精或中樞神經抑制劑併用，具加乘作用。

2.MAO inhibitors會延長並加強乙醯膽鹼效果。

注意事項：

1.新生兒、早產兒、授乳之母親及對Cyproheptadine或MAOI敏感者禁止使用本藥。

2.青光眼、前列腺肥大、氣喘、幽門狹窄、年老虛弱之病人禁用本藥。

3.二歲以下兒童之用量尚未建立。

4.小孩或嬰兒服用過量會造成嗜睡、中樞神經抑制、痙攣和死亡。

5.老年人服用本藥易造成眩暈、鎮靜和低血壓。

6.服用本藥後應避免開車或操作機械。

150.00 mm

副作用：

- 1.嗜眠、噁心、下痢、腹痛、頻尿等。
- 2.在血液方面有：紫斑、血小板減少、白血球減少之現象。
- 3.過敏症狀：發疹、水腫、蕁麻疹、對光敏感。

賦形劑：Alcohol, Sucrose, Methylparaben, Citric Acid Anhydrous, Tartrazine, Sunset Yellow FCF, Pineapple Flavor, Water Purified

包裝：60~4000毫升塑膠瓶裝

儲存：

- (1)本品應置於兒童不及之處。
- (2)請密封儲存於25°C以下，毋須冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

**CENTER LABORATORIES INC.**

地址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-032 20150728

14C13-D01