

"生達" 力克敏錠 2 毫克 (右氯敏)

DELAMIN TABLETS 2MG "STANDARD"

(DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATE)

衛署藥製字 第 026559 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

本品之主成分Dexchlorpheniramine maleate為一種抗組織胺劑，屬於Chlorpheniramine maleate的光學右旋體，但藥效較Chlorpheniramine maleate大兩倍，可有效抑制許多組織胺反應。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每錠含：Dexchlorpheniramine Maleate.....2mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Lactose Monohydrate、Talc、Food Red No.6、Erythrosine、Povidone K-30、Sodium Saccharin、Sodium Lauryl Sulfate、Water Purified、Magnesium Stearate

2 用途(適應症)

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀 (流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢) 及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.2.2 嚴重代謝性肝腎疾病的人。

3.2.3 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 65歲以上。

3.3.3 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

3.3.4 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 不得與酒精性飲料併用。

3.4.5 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

4 用法用量

年齡	劑量	使用次數
成人及12歲以上	每次1錠	一日3至4次，每次間隔4小時以上服用
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2	
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4	
3歲以下	請洽醫師診治	

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮
其他	口乾、視覺上之困擾

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

6 包裝

6-1000錠鋁箔盒裝及塑膠瓶裝

7 儲存方式

儲存於25°C以下。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品

製造廠

生達化學製藥股份有限公司

台南市新營區土庫里土庫6之20號

藥商

生達化學製藥股份有限公司

台南市新營區土庫里土庫6之20號