

立安 錠2毫克



042002

Doxter Tablets 2 mg

[說明]

本品可做為治療高血壓的第一線用藥，病人若單獨使用一種降血壓藥，而無法達到療效時，本品可和thiazide類利尿劑、 β -阻斷劑、鈣離子拮抗劑或血管加壓素轉化酶抑制劑併用。

本品可適用於尿流阻塞與因良性前列腺肥大所引起的阻礙症狀(遲尿、間歇滴尿、尿流減弱、膀胱排空不完全)及不適症狀(夜尿、白天次數增加、灼熱感)。本品可用於所有高血壓或正常血壓而患有良性前列腺肥大的病人。以本品對高血壓併有良性前列腺肥大的病人作單一療法後，發現本品可快速改善症狀，且改善66-71%病人的尿流速率。在14星期的雙盲研究及2年的開放式研究中，本品皆可持續地改善病人的症狀。

[特性]

藥理學特性(Pharmacodynamic Properties)

本品經由選擇性和競爭性的阻斷突觸後 α_1 -腎上腺素受體而產生血管擴張作用。本品經由降低全身血管阻力，而達明顯降壓效果，且一天服用一次可有效維持24小時的降壓效果，一般降壓作用於服藥後2-6小時達最高點，高血壓病人於服用本品期間，其仰臥和站立姿勢的血壓很相近並不像其它非選擇性 α -腎上腺素受體抑制劑。長期服用本品少見血漿腎素活性的提高或心悸的產生。

本品能產生有利的脂質代謝作用，可明顯提高HDL/total cholesterol 比例，降低total triglycerides 和total cholesterol 的量。這是利尿劑和 β -腎上腺素阻斷劑所沒有的優點，前二者對脂質代謝有不良作用，由於高血壓和脂質與冠狀動脈心臟疾病有關，本品對此二者具有利之作用效果，因此能降低引發冠狀動脈心臟病的危險性。

使用本品治療時能減少左心室肥大，抑制血小板凝集和增強組織胺酸素原活化劑的活性，此外，本品能改善胰臟功能不良病人對胰島素的敏感性。

本品不會產生不良的代謝作用，因此也適用於併有氣喘、糖尿病、左心室功能不良、痛風、良性前列腺腫和老年的高血壓病人。

藥動學特性(Pharmacokinetic Properties)

吸收

本品口服後吸收良好，約2小時可達血中最高濃度，對老年人及腎功能欠佳的病人之藥動學和年輕且腎功能正常者並無明顯差異，目前尚未對肝功能不良病人做試驗，也未對影響肝臟代謝的藥物(例如cimetidine)等進行藥品作用研究。

代謝/排泄

其末端血漿半衰期為22小時，所以一天只需服用一次。本品大多會被代謝，只有小於5%以原型排出。

[成份]

每錠中含有
Doxazosin 2 mg
(as Doxazosin Mesylate 2.43 mg)

[適應症]

高血壓、良性前列腺肥大。

[用法·用量]

本藥須由醫師處方使用。

劑量

本品用於治療高血壓的劑量範圍是每日1~16毫克，起始劑量為1毫克，一天一次，然後按照病人的反應，每隔1~2星期將每日劑量調整為2毫克、4毫克、8毫克或16毫克(最大劑量)，至病人血壓降至理想狀態，一般使用的劑量為每天2至4毫克。

本品用於治療良性前列腺肥大之劑量範圍為每日1~8毫克，起始劑量為1毫克，一天一次，然後根據病人的排尿力學及良性前列腺肥大的症狀，每隔1~2星期將每日劑量調整到2毫克、4毫克甚至8毫克。在給藥期間必須定時地評估病人的血壓。

腎功能不良病人之使用

因為本品的藥物動力學在腎功能不良的病人沒有改變，亦無證據顯示本品會惡化腎功能不良的情況，因此腎功能不佳的病人可依一般的劑量給與。

小孩之使用

到目前為止無小孩使用之經驗。

[禁忌]

禁用於對quinazolines 過敏的病人。

[警語及應注意事項]

藥物交互作用

大部份(98%)血漿中的本品都和蛋白質結合，體外實驗資料顯示，本品不會影響digoxin、warfarin、phenytoin或indomethacin和蛋白質的結合。本品也不會和thiazide利尿劑、furosemide、 β -blockers、非類固醇消炎劑、抗生素、口服降血糖藥，促尿酸排泄劑或抗凝血劑等產生不良之藥物交互作用。

孕婦及授乳婦

在動物試驗中，大約300倍之人體最高劑量會降低胎兒的存活率，雖然未發現畸形現象，但懷孕或授乳期使用本品的安全性尚未建立，因此孕婦或授乳婦應在醫師認為對母親及胎兒利多於弊時方可使用本品。

開車及操作機械之影響

使用本品會減弱患者駕駛及機械操作能力，尤其是在用藥初期。

[不良反應]

對照臨床試驗顯示，高血壓病人使用本品後最常見的不良反應為姿勢性(少與暈厥有關)或非特異性的頭昏、頭痛、疲勞不適、姿勢性頭昏、暈眩、水腫、虛弱、嗜眠、噁心及鼻炎。極少數的病例被報告有尿失禁的現象，此現象可能與本品的藥理作用有關。下列的不良反應為本品治療高血壓曾被報告過之症狀，此類症狀在未服用本品時亦可能發生於高血壓之病人：心跳過速、心悸、胸痛、心絞痛、心肌梗塞、腦血管病變及心律不整。

[過量]

如果服用過量產生低血壓，病人應仰臥，頭部放低，如果需要的話，也可使用其它支持性療法，由於本品和蛋白質結合率頗高，所以不能用透析法除去。

[貯存條件]

本品請妥為貯於30°C以下，且置於小孩伸手不及處。

[賦形劑]

Avicel PH102, Spray dried lactose, Primojel, Magnesium stearate, Sodium lauryl sulfate.

[包裝]

2~1000錠，塑膠瓶裝；鋁箔盒裝。

G-7717
衛署藥製字第 045013 號

健喬信元醫藥生技股份有限公司

藥商地址：303新竹縣湖口鄉工業一路6號

製造廠名：健喬信元醫藥生技股份有限公司 健喬廠

製造廠址：303新竹縣湖口鄉工業一路6號

SLT0420C