

廣效性抗生素

"元宙"**多士林**膠囊(去氧環四環素)
Doxycycline capsules

衛署藥製字第 023648 號

【成份】Each capsule contains:
Doxycycline HCl..... 115 mg (potency)
(Equivalent to doxycycline 100 mg)

【作用】本品為廣效性抗生素，它可抑制細菌蛋白質之合成，進而抑制殺死細菌，其作用範圍與其他四環素之抗生素作用範圍約為一樣，對多數 G(+) 及 G(-) 均有效，其不同點在其口服後吸收完全及其持久之體內抗菌效能，本劑口服常用量第一天為 200 mg，及此後每天 100 mg 臨床上即相當於每日 1 g 之四環素作用並且本品對四環素、青黴素，及紅黴素等已產生抗藥性之葡萄球菌感染有效外，並能阻止或遲緩葡萄球菌產生抗藥性。

【適應症】革蘭氏陽性、陰性菌、立克次氏體及巨型濾過性病毒感染症。

【用法用量】通常成人首日量為 200 mg 分 1~2 次服用，此後每日服用一粒 (100 mg)；兒童首日 4 mg/kg，第 2 日起為 2 mg/kg，分為 1~2 次服用。
本藥須由醫師處方使用。

【注意】1. 本抗生素用作口服或注射時可能導致嚴重之肝臟或腎臟變壞，尤以作為孕婦之感染治療時為然，故在使用本劑前及使用期間內應作肝腎機能及血尿素氮之檢查，在發現對肝腎有副作用發生時，當即停止使用，或予適當之治療，則常可恢復正常。
2. 如患者腎臟機能有障礙時，僅以口服或非口服常用劑量，即可導致藥物體內蓄積量超過及可能發生肝臟中毒，在此狀況下，應使用比正常量為少之劑量，如治療需延長時，應注意測定血清中四環素濃度。
3. 發現有過敏現象時應即停止使用。
4. 治療期間同時觀察有否促成抗生素常有之無感受性菌之生長(尤以白色念珠菌之感染)，如發現則酌量服用或借他法防止之。

【賦形劑】Lactose monohydrate、Starch (anhydrous)、Sodium lauryl sulfate、Magnesium stearate、Silicon dioxide hydrated、Polyplasdone XL-10、Capsule: (Gelatin、Sodium lauryl sulfate、Brilliant blue FCF、New coccin、Titanium dioxide、Tartrazine、Purified water)。

【儲存條件】25°C 以下儲存。

【包裝】4~1000 粒塑膠瓶裝。



元宙化學製藥股份有限公司
YUAN CHOU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD

南投市南崗工業區南崗三路 272 號
TEL: (049) 2253190