

鎮 暈 劑

“強生”達姆明錠 50毫克
DIMENHYDRINATE TABLETS 50mg "JOHNSON"
內衛藥製字第001728號

【成 分】每錠含有：Dimenhydrinate.....50mg
【賦 形 劑】Corn Starch、Lactose Monohydrate、Magnesium Stearate、Povidone K30、Sodium Starch Glycolate

【適 應 症】預防或緩解動暈症（暈車、暈船、暈機）引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

【用法·用量】預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前30～60分鐘服用之，成人1次1錠，12歲以上，適用成人劑量。6歲以上未滿12歲，適用成人劑量之1/2。6歲以下之兒童，請洽醫師診治，不宜自行使用。必要時，可於持續搭乘交通工具或症狀出現時再行服用。每次間隔時間應在6小時以上，24小時內不可超過4次。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注 意 事 項】1.為防止兒童誤食請妥善保管。

2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

3.除非有醫師藥師藥劑生指示，孕婦、可能懷孕婦女及授乳婦不建議自行使用。

4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應停止使用並請教醫師藥師藥劑生。

5.不得併服含酒精飲料。

6.服用本藥若有不了解之處，請洽詢醫師藥師藥劑生。

【警 語】1.服用本藥後，可能引起思睡、倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應（以幼兒及老年人較常見），老年人應小心使用本藥，如症狀持續加強，宜停藥就醫。

2.除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。

3.除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：

(1)6歲以下不建議自行使用。

(2)曾經因本藥物引起過敏症狀者不得使用。

4.下列病患使用鎮暈藥前，應詢問醫師藥師藥劑生：

(1)接受醫師治療並服用藥物者。

(2)大於65歲以上者。

(3)本人或家族具過敏體質者。

5.除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺功能亢進、腎臟病者不得服用。

6.除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑、安眠劑及其他含有抗組織胺成分之內服製劑（如其他鎮暈藥、綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥物或抗過敏藥等）。

7.如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難，請勿服用此藥。

8.服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。

9.如發生皮膚發疹、發紅、癢疹、頭痛、臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、浮動、不安定感、口乾、便秘及下痢等症狀時，請停止服用，並持藥品包裝及說明書，詢問醫師藥師藥劑生。

【包 裝】1,000錠以下 塑膠瓶裝。



Code No. : G-11

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市241三重區三和路四段77、79號

訂貨專線:(02)29894756 FAX:(02)29712579

工廠電話:(02)22878405