

克潰淨外用液 POLILEN Ext. Solution

『組成』：每Gm含
Policresulen.....360 mg
(Eq. to Policresulen 50 %.....720 mg)

PIC/S GMP 藥品G-9203
衛署藥製字第048148號

『賦型劑』：SODIUM PHOSPHATE DIBASIC、POTASSIUM PHOSPHATE MONOBASIC、DEHYDROACETATE SODIUM、PURIFIED WATER。

『適應症』：子宮頸糜爛、子宮頸炎、陰道炎、白帶、外陰搔癢、灼傷組織的清創、洗滌傷口。
本藥須由醫師處方使用。

『藥物交互作用』：本品僅能局部使用，在治療期間不可使用其他的局部使用製劑於同樣部位，以避免藥物交互反應。

『用法用量』：本藥須由醫師處方使用

『婦科』：做為陰道灌洗，一份克潰淨外用液應以五份水稀釋使用。用於表面或深部組織傷害的局部治療，克潰淨外用液則無需被濃縮使用。燒灼感在每星期使用一或二次後會發生。以克潰淨外用液做局部治療應以檢視鏡、敷料、鑷子和紗布協助使用。在治療前需先以克潰淨外用液清潔子宮頸和子宮頸管以移除黏液。為此，應先以棉花棒吸取克潰淨外用液後深入子宮頸管擦拭數回再丟棄。治療時，以紗布吸取克潰淨外用液後導入並輕壓病灶組織約1~3分鐘。同樣地，未稀釋的克潰淨外用液可用來止血，以浸濕紗布壓住出血部位1~2分鐘。

『外科和皮膚科』：為達止血作用，傷口必須先擦乾再以克潰淨外用液之浸濕紗布壓住出血部位1~2分鐘。清潔治療部位殘留之外用液是適當的，雖並非是必須的。為治療局部燒傷，褥瘡和腿部靜脈曲的潰瘍以除去腐化的壞死組織，克潰淨外用液應以同樣方式給藥。口腔黏膜和牙齦以克潰淨外用液治療後，口腔必須徹底清潔。

- 『注意』：
- 1、應避免眼部接觸克潰淨外用液。
 - 2、如有棉織物及皮革與克潰淨外用液接觸後，必須在製劑未乾前立即洗乾淨。
 - 3、所有器材於使用後，應立刻置於水盆中（最好加入1~2%碳酸鈉），直到無菌狀態。
 - 4、過期的克潰淨外用液不可使用。
 - 5、藥物應置於孩童拿不到之處。
 - 6、克潰淨外用液會在治療過程中產生刺激作用。如果壞死組織由病灶區脫落，即使是大量時，無需驚恐。
 - 7、在治療期間不可用刺激性肥皂清洗或性交。
 - 8、與其他陰道製劑一樣，克潰淨外用液在月經來時不可使用。

『副作用』：在以 **Policresulen** 治療初期會有局部刺激作用，但通常迅速地消退。當用以治療口腔粘膜時，必須注意 **Policresulen** 之高酸性可能造成牙齒釉質損傷。

『禁忌』：懷孕初期特別是懷孕初期，任何有關子宮頸內部的治療均需避免。

外子宮頸連接部份燒灼術及陰道應僅在有特別指示時才可使用，且需極度小心使用。

在懷孕初期，**Policresulen** 給藥應考慮其對母親及胎兒之絕對必需性時才可給藥。

動物實驗並未有任何畸形報告顯示。研究至目前尚無法說明懷孕婦女的給藥危險性，尚且不知是否主成份會排於授乳婦的乳汁內。

『儲藏』：本品應保存於不超過25°C的室溫中。

『包裝』：4000毫升以下玻璃瓶裝、塑膠瓶裝。

委託者：

凱信藥品有限公司
新竹縣湖口鄉明德街216號

製造廠：

羅得化學製藥股份有限公司
台中市大甲區東西七路一段65號