



# "杏輝" 貝他每松軟膏

## BETAMETHASONE OINTMENT "SINPHAR"

衛署藥製字 第 019616 號

本藥須由醫師處方使用

版本日期 2022-10-17

### 1 性狀

#### 1.1 有效成分及含量

每gm含：

Betamethasone dipropionate equivalent to  
Betamethasone.....0.5mg

#### 1.2 賦形劑

花香味

Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、Methyl paraben、Propyl paraben、Liquid petrolatum、White petrolatum、Span 60、Tween 60、Perfume、Water purified  
清涼

Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、Methyl paraben、Propyl paraben、Liquid petrolatum、White petrolatum、Span 60、Tween 60、Perfume、Menthol、Camphor、Water purified

原味

Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、Methyl paraben、Propyl paraben、Liquid petrolatum、White petrolatum、Span 60、Tween 60、Water purified

#### 1.3 劑型

軟膏劑。

#### 1.4 藥品外觀

白色軟膏。

### 2 適應症

皮膚炎，皮膚過敏及其他皮質類固醇具有療效之皮膚疾病。

### 3 用法及用量

#### 3.1 用法用量

敷用本品於患處，早晚各一次。

### 4 禁忌

牛痘、水痘，以及患者過去對於類固醇藥物有過敏之記錄者不宜敷用本品。

### 5 警語及注意事項

#### 5.1 警語/注意事項

如敷用本劑，有刺激性之反應，應即停藥，並予以適當之治療。如皮膚有其他感染，應同時施用適切的抗黴及抗菌製劑。如未見效，則宜暫停本品，俟感染之皮膚獲得控制後再行敷用本品。長期連續或不當使用局部皮質類固醇類藥品會導致停止治療後出現反彈性發作（局部類固醇戒斷反應）。嚴重反彈性發作範圍可能超出初始治療部位，其症狀可能以皮炎伴有強烈發紅、刺痛和灼熱感，特別使用於臉部和彎曲區域等較為嬌嫩皮膚部位時更容易發生。如果在治療成功後數天至數週內再次出現上述症狀，應懷疑可能為反彈性發作。另如需重新使用局部皮質類固醇類藥品，請謹慎評估其臨床效益與風險，或考慮改以其他治療方案替代。

## 6 特殊族群注意事項

目前尚無資訊。

## 7 交互作用

目前尚無資訊。

## 8 副作用/不良反應

### 8.1 臨床重要副作用/不良反應

皮膚和皮下組織疾病-戒斷反應(頻率未知)：皮膚發紅，可能會蔓延超出初始治療區域，灼熱或刺痛感，搔癢，皮膚脫屑，滲膿。

## 9 過量

目前尚無資訊。

## 10 藥理特性

### 10.1 作用機轉

Betamethasone dipropionate 具有抗炎，止癢及收縮血管之特性，故對皮質類固醇有反應之諸種徵症有效。

### 10.2 藥效藥理特性

本品是合成類固醇具抗發炎，消除腫脹、止癢、減少患部滲出液以及各種皮膚炎之消炎等療效，作用確實、顯著且持久。

### 10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

## 11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

## 12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

## 13 包裝及儲存

### 13.1 包裝

1000公克以下鋁管裝、積層鋁管裝、塑膠罐裝。


### 13.2 效期

111.10.17

如包裝所示。

13.3 儲存條件

30°C以下保存。



**製造廠**

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

**藥商**

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號