

# 利膚外傷軟膏

## B. &N. BACINEOCIN OINTMENT

衛署藥製字 第 022990 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-18

版次 2

本藥是一種外用廣效抗生素，對於多種格蘭氏陽性菌、格蘭氏陰性菌有抑菌、殺菌作用。

### 1 成分

#### 1.1 有效成分及含量

##### 每公克含

Neomycin Sulfate ..... 5mg (eq to 3.5mg potency)

Bacitracin Zinc ..... 12.5mg (eq to 500 units)

#### 1.2 其他成分(賦形劑)

White Petrolatum、Liquid Paraffin。

### 2 用途(適應症)

緊急處理、預防因皮膚外傷 ( 如刀傷、擦傷、刺傷、抓傷、磨傷、輕微燙傷 ) 造成的感染或減緩傷口的感染。

### 3 使用上注意事項

#### 3.1 有下列情形者，請勿使用

1. 曾因本藥成分引起過敏。

#### 3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

1. 3歲以下。

2. 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。

#### 3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

1. 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

#### 3.4 其他使用上注意事項

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。

2. 避免陽光直射。

3. 勿超過建議使用量或使用次數。

4. 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

6. 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。

7. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
8. 本藥勿使用於大面積之體表（以超過使用者的兩手掌面積為參考）。
9. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

#### 4 用法用量

每日 1-3 次 局部清潔後，適量均勻塗抹於患部，需要時得以滅菌紗布或繃帶覆蓋

#### 5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹等過敏性皮膚炎
耳朵	耳毒性
腎臟	腎毒性

5.2 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

1. 若有上述外之其他不適情況產生。
2. 使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

#### 6 包裝

100公克以下鋁軟管、塑膠罐裝，450公克塑膠罐裝。

#### 7 儲存方式

本品應存放於25°C以下，避光保存。

#### 製造廠

西德有機化學藥品股份有限公司 新北市三重區中正北路560巷36號

#### 藥商

西德有機化學藥品股份有限公司 新北市三重區中正北路560巷36號