

強力施美藥膏

C.B. Ointment "Strong"

內衛藥製字 第 004550 號
醫師藥師藥劑生指示藥品
版本日期 2022-05-06

作用：

- Chlorpheniramine maleate：具止癢作用。
- Lidocaine HCl：含有可暫時緩解因皮膚刺激所引起之疼痛及搔癢症狀之成分。
- Methyl Salicylate、Menthol、Camphor等具有鎮痛、止癢、及清涼等作用。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每公克含有

有效成分	含量
Chlorpheniramine maleate	10mg
Lidocaine HCl	30mg
Methyl Salicylate	10mg
dl-Menthol	10mg
dl-Camphor	5mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Stearyl alcohol、Cetyl alcohol、Glycerol monostearate、Liquid petrolatum、Tween 60、Span 60、Propylene glycol、Hexachlorophene、Water purified

2 用途(適應症)

暫時緩解尿布疹、蚊蟲咬傷、皮膚搔癢、皮膚炎等皮膚疾患的症狀。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

- 3.1.1 曾因本藥成分引起過敏。
- 3.1.2 曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象者。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

- 3.2.1 3歲以下。
- 3.2.2 深部皮膚組織感染。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 要使用於臉部。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量或使用次數。

3.4.4 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

3.4.5 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

3.4.6 本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜（如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等）、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。

3.4.7 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

3.4.8 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

3.4.9 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

3.4.10 請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。

3.4.11 本藥不可連續使用超過7天。

3.4.12 不得大量使用，以避免全身性吸收，曾有致死報告。

3.4.13 避免觸碰衣物、塑膠品、木材、金屬。

3.4.14 不可長期大面積使用，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛，使用前請諮詢醫師或藥師。

4 用法用量

需要時使用	適量塗抹/塗擦於患部
-------	------------

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	局部灼熱、刺痛、過敏性反應、紅斑、搔癢、刺痛感。
其他	水楊酸效應（耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等）

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。

5.2.2 使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

6 包裝

1000公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝。

7 儲存方式

於室溫(15-30°C以下)保存，並置於孩童無法觸及之處。

製造廠

中國化學製藥股份有限公司新豐工
廠

新竹縣新豐鄉坑子口182之1號

藥商

中國化學製藥股份有限公司新豐工
廠

新竹縣新豐鄉坑子口182之1號