



"杏輝"欲克黴乳膏

ECONALONE CREAM "SINPHAR"

衛署藥製字 第 025567 號

本藥須由醫師處方使用

版本日期 2023-01-11

1 性狀

1.1 有效成分及含量

Each gm contains:

Econazole Nitrate.....10mg

Triamcinolone Acetonide.....1mg

1.2 賦形劑

Propylene glycol、Cetyl stearyl alcohol、White petrolatum、Liquid petrolatum、Span 60、
Tween 60、Methyl paraben、Propyl paraben、Sodium bisulfite、Edetate disodium、
Perfume (ireine)、Silicone oil、Water purified

1.3 劑型

乳膏劑。

1.4 藥品外觀

白色乳膏。

2 適應症

皮膚因真菌群、酵母菌群、霉菌群所引起之皮膚病。

3 用法及用量

3.1 用法用量

將本品塗敷於患部並按摩使滲入皮膚，早晚各塗擦一次，塗用2天後發炎症狀大為減輕，應再繼續使用，直至完全治癒為止，對難治的皮膚癬通常須2-4週可痊癒。

3.2 調製方式

不適用。

4 禁忌

結核性損害(tuberculous lesions)或病毒性皮膚病(Virus dermatitis)如：疱疹、牛痘、水痘等本禁用本品。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

長期連續或不當使用局部皮質類固醇類藥品會導致停止治療後出現反彈性發作（局部類固醇戒斷反應）。嚴重反彈性發作範圍可能超出初始治療部位，其症狀可能以皮炎伴有強烈發紅、刺痛和灼熱感，特別使用於臉部和彎曲區域等較為嬌嫩皮膚部位時更容易發生。如果在治療成功後數天

至數週內再次出現上述症狀，應懷疑可能為反彈性發作。另如需重新使用局部皮質類固醇類藥品，請謹慎評估其臨床效益與風險，或考慮改以其他治療方案替代。

6 特殊族群注意事項

目前尚無資訊。

7 交互作用

目前尚無資訊。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

本劑之耐受性極佳，甚而對易敏感性皮膚亦無不良副作用之報導，只有少數的使用者皮膚會有灼感搔癢和紅腫等現象發生，過敏現象偶爾也會產生。

皮膚和皮下組織疾病-戒斷反應(頻率未知)：皮膚發紅，可能會蔓延超出初始治療區域，灼熱或刺痛感，搔癢，皮膚脫屑，滲膿。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

10.2.1 Econazole Nitrate專門治療由皮膚真菌群(Dermatophytes)酵母菌群(Yeasts)及黴菌群(Moulds)等所引起的黴菌感染，如濕疹性黴菌病(eczematous mycosis)、輪廓性濕疹、頑癬(eczema marginatum Hebrae)、環狀疱疹(herpesircinatum)、毛髮癬菌性毛囊炎(folliculitis tri-chophytica)、鬚瘡(Sycosis barbae)，另外對G(+)細菌亦有抗菌效果。

10.2.2 Triamcinolone Acetonide對濕疹、皮膚炎群、皮膚搔癢症、癢疹群、乾癬掌蹠膿疱症、紅斑症、紅皮症、皮膚粘膜症候群、圓形脫毛症有效。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

1000公克以下鋁管、塑膠瓶裝。

13.2 效期

如包裝所示。

13.3 儲存條件

25°C以下保存。

14 病人使用須知

目前尚無資訊。

15 其他

本劑是一種近代理想用於發炎性黴菌感染治療劑，對各種真菌及G(+)細菌所引起之皮膚病，如發炎性皮膚疹、濕疹、嬰兒尿布疹、香港腳、汗斑及各種皮癬，效果顯著。本劑含有強力抗黴菌感染劑 - Econazole nitrate，及強力抗發炎、抗過敏、抑制搔癢之類固醇製劑-Triamcinolone acetonide，兩者成分適當的配合，效果加乘，耐受性佳，對易敏感性皮膚亦無不良副作用，據國外臨床顯示，其治療效果高達98%。

製造廠

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

藥商

杏輝藥品工業股份有限公司

宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號