



# 意如宮錠 0.2 毫克 ( 縮水蘋果酸麥角新 )

## ERGOMETRINE TABLETS 0.2MG "YUNG SHIN"

衛署藥製字 第 029784 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-09-13

### 1 性狀

#### 1.1 有效成分及含量

每錠中含：Ergometrine Maleate.....0.2mg

#### 1.2 賦形劑

Microcrystalline Cellulose、Synthetic Aluminum Silicate、Stearic Acid、Cochineal Red A、Sodium Starch Glycolate、Silicon Dioxide Colloidal、Polyethylene Glycol 6000、Povidone。

#### 1.3 劑型

錠劑。

#### 1.4 藥品外觀



### 2 適應症

分娩時的子宮弛緩性出血、流產後出血、產褥期出血、子宮內膜刮除後的出血、子宮收縮不全。

### 3 用法及用量

#### 3.1 用法用量

每次1錠，1日3次，視症狀適宜增減。

### 4 禁忌

(依文獻記載)

#### 4.1 孕婦。

#### 4.2 胎兒頭部娩出之前。

#### 4.3 以前曾對麥角類製劑有過敏症之既往歷之患者。

### 5 警語及注意事項

(依文獻記載)

#### 5.1 警語/注意事項

5.1.1 Ergometrine Maleate有蓄積作用，投藥時請注意。

## 5.1.2 慎重投與：

5.1.2.1. 有高血壓、妊娠中毒症、心疾患、閉塞性血管障害之患者。

5.1.2.2. 有肝疾患、腎疾患之患者。

5.1.2.3. 有敗血症之患者。

## 5.1.3 強效CYP3A4抑制劑

合併麥角生物鹼類藥品（如ergotamine、dihydroergotamine）與強效CYP3A4抑制劑可能會引起罕見但嚴重之血管攣縮導致顱部及／或周邊缺血。雖然目前尚無Ergometrine與強效CYP3A4抑制劑併用發生上述不良反應之案例報告，仍應避免Ergometrine與強效CYP3A4抑制劑併用。強效CYP3A4抑制劑包含如ceritinib、cobicistat、protease inhibitor（如ritonavir）、azole類抗黴菌藥（如itraconazole、posaconazole、voriconazole）、巨環類抗生素（如erythromycin、clarithromycin）。

## 7 交互作用

（依文獻記載）

## CYP3A4抑制劑

強效CYP3A4抑制劑將增加麥角生物鹼類藥品（如ergotamine、dihydroergotamine）之血中濃度，提升血管攣縮以致顱部及／或周邊缺血之風險。雖然目前尚無Ergometrine與強效CYP3A4抑制劑併用風險之研究，仍應避免Ergometrine與強效CYP3A4抑制劑併用（詳5. 警語及注意事項處）。同時，與中效CYP3A4抑制劑併用時應謹慎使用；處方Ergometrine時，處方者應考量合併用藥對於CYP3A4酵素之影響。

## 8 副作用/不良反應

（依文獻記載）

## 8.1 臨床重要副作用/不良反應

8.1.1 消化器：噁心、嘔吐、腹痛、下痢等症狀。

8.1.2 循環器：血壓上升、頻脈、徐脈等症狀。

8.1.3 精神神經系：頭痛、頭部後方麻木感、睏倦、眩暈、口乾、耳鳴、發熱感、皮膚冷感與奮等症狀。

8.1.4 其他：留滯胎盤、肌肉痛、壞疽等症狀。

## 8.2 臨床試驗經驗

目前尚無資訊。

## 9 過量

（依文獻記載）

目前尚無資訊。

## 10 藥理特性

（依文獻記載）

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

10.2.1 本藥對子宮的作用為直接刺激子宮平滑肌而引起節律性收縮，對產後的子宮作用更大。

10.2.2 本藥有收縮血管的作用，對小血管的作用特別顯著，所以用於產後減少出血之效果很好。又其血管收縮作用不會導致血壓上昇的現象。

10.2.3 消化道之吸收快，口服數分鐘後，即可引起子宮收縮。

10.2.4 本藥口服吸收容易，對子宮外的平滑肌作用小，對分娩後出血的止血作用強且持續時間長，為一子宮收縮、止血劑

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

(依文獻記載)

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

(依文獻記載)

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

6~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

13.2 效期

如外包裝標示。

13.3 儲存條件

室溫25°C以下儲存。

13.4 儲存注意事項

本藥應置於小兒伸手不及處。

請在有效期限內使用。

**製造廠**

永信藥品工業股份有限公司台中幼  
獅廠

台中市大甲區日南里工九路27號

**藥商**

永信藥品工業股份有限公司

台中市大甲區頂店里中山路一段1191號