



"華盛頓"氧化鋅軟膏

ZINC OXIDE OINTMENT "WST"

衛署藥製字 第 014238 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2024-03-06

1 成分

1.1 有效成分及含量

Each gm ointment contains :

Zinc Oxide.....200 mg

1.2 其他成分(賦形劑)

White Petrolatum、Liquid Paraffin(EQ to liquid Petrolatum) (EQ to Mineral oil)、Tefose 63(Mono & Di-stearic esters of Ethylenegl)、Cetyl Palmitate、DC 200/100。

2 用途(適應症)

緩解皮膚刺激及尿布疹。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.2 有深部皮膚組織感染。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 兒童需於監護者的指導與監護下使用。

3.4.3 避免陽光直射。

3.4.4 勿超過建議使用量或使用次數。

3.4.5 使用部位或周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

3.4.6 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

3.4.7 本藥限於外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。

3.4.8 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。

3.4.9 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

3.4.10 使用後請保持塗抹部分透氣，勿密封，以免增加副作用。

3.4.11 易燃性外用液劑之外部容器或外部包裝需刊載：勿接近火源。

3.4.12 患有下狀況者，建議不要使用。

◆有傷口或紅腫。

◆傷口流膿或潰爛。

4 用法用量

需要時使用	適量塗於患部。
-------	---------

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅、發癢、刺激感、脫皮

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有上述外之其他不適情況產生。

5.2.2 連續使用7天後，自覺症狀沒有改善或更惡化。

6 包裝

1000公克以下鋁軟管裝、塑膠罐裝。

7 儲存方式

請儲存於 25°C以下乾燥處避光。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

製造廠

華盛頓製藥廠股份有限公司

高雄市仁武區仁武里工業二路12號

藥商

華盛頓製藥廠股份有限公司

高雄市仁武區仁武里工業二路12號