

"元宙" **鐵達寧** 咀嚼錠  
Tedralin Chewable Tablets "Y. C."

衛署藥製字第 046166 號

**【成分】** Each tablet contains:

Iron (III) (Hydroxide polymaltose complex)..... 100 mg

**【特性】** 此錠特別發展來治療鐵質缺乏症，此錠含有 100 mg 之鐵質，可一天一次給藥。因本劑之鐵是以非離子的 iron polymaltose complex 之形式給予，所以服用此錠將不會引起一般離子性鐵鹽常見的副作用，如胃腸障礙，牙齒變色，金屬味及與其他食物、藥物之相互作用。此錠除了本身有很好的耐受性外，還有很高的安全域。存在於此錠中之 iron polymaltose 的口服毒性很低，所以意外過度服用所造成之鐵中毒可不必顧慮。本劑經各種身體可用率實驗及臨床比較證實鐵之吸收利用與亞鐵鹽完全相同。

**【適應症】** 預防及治療鐵質缺乏症、缺鐵性貧血症。

**【用法用量】** 正常情況，每天一錠，任何時間服用均可。隨病人喜愛，可隨後飲用液體物。此錠也可以和液體物一起吞食，如果需要，劑量可增加為一天服用兩次，每次一錠，依據醫師指示，在餐前、餐後或一起服食均可。為能補充體內鐵質之庫存，在血值 (Hb. Ht. 紅血球) 正常後，最好再繼續服用一個月。本藥須由醫師處方使用。

**【治療持續時間】** Hb 值為 90 g/l 或以上時的劑量是每天一錠 (100 mg)

體重 (kg)	治療持續時間 (週)					
	Hb 60 g/l	Hb 75 g/l	Hb 90 g/l	Hb 105 g/l	Hb 120 g/l	Hb 135 g/l
35	7	6	7	6	5	4
40	8	7	8	7	6	5
45	9	7	8	7	6	5
50	9	8	9	7	6	5
55	10	9	9	8	6	5
60	11	9	10	8	7	5
65	12	10	10	9	7	5
70	12	11	11	9	7	5
75	13	11	11	9	7	6
80	14	12	12	10	8	6
85	15	13	12	10	8	6
90	15	13	13	11	8	6

**【注意事項】** 糞便將呈暗黑色，此以鐵質治療所會發生的，沒有關係。

**【禁忌症】** 人體中，鐵質過份負荷者、鐵質利用阻礙者。

如果是傳染性或腫瘤性鐵質不足之貧血症，鐵質將會儲存在 RES 中，鐵質之代謝及利用將不會發生效用，除非原發疾病完全痊癒。

**【賦形劑】** Povidone、Silicon dioxide hydrated、Cellulose microcrystalline、Cocoa powder、Mannitol、Chocolate (Flavour)、Saccharin soluble、Ultraflo-F85W。

**【包裝】** 2~1000 錠，鋁箔盒裝與塑膠瓶裝。

**【儲存】** 室溫 25°C 以下緊密容器保存。



元宙化學製藥股份有限公司  
YUAN CHOU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD

南投市南崗工業區南崗三路 272 號  
TEL: (049) 2253190

中英文品名	
衛署(部)字號	
成分與含量	
賦形劑	
經銷商資訊	
適應症	
尺寸	
版次	

擬稿日期：2021年08月09日

尺寸：寬13.5 X 高19.6cm ±0.3cm