

一種對G(+)及厭氣細菌皆有效的抗生素

"南光" 克力欣 注射液150毫克/毫升(克林達黴素) Clincin Injection "N.K." 150mg/ml (Clindamycin)

◆主 成 份:

Each ml contains:

Clindamycin Phosphate eq to Clindamycin.....150mg(potency)

◆賦形劑: Edta Disodium Salt、Sodium Metabisulfite、Dibasic Sodium Phosphate Dihydrate、Methylparaben、Propylparaben、Benzyl Alcohol、Water for Injection。

◆特 點:

本藥與Lincomycin同屬於lincosamides類抗生素，雖然兩者在許多方面近似，但因Clindamycin吸收較佳，藥效更強而且毒性較小，所以兩藥中以Clindamycin較優。

◆殺菌範圍:

革蘭氏陽性細菌	厭氣性細菌
Staphylococcus aureus S. albus S. epidermidis S. Pyrogenes Streptococcus pneumoniae β -hemolytic streptococci S. viridans Corynebacterium diphtheriae Nocardia asteroides	Bacteroides species Fusobacterium Propionibacterium Eubacterium Antinomyces species Peptococcus Peptostreptococcus Microaerophilic streptococci Clostridium perfringens C. tetani Veillonella

◆藥動力學:

投予 方式	平均最高血清濃度 (mcg/ml)	達到最高血清濃度 所需的時間(小時)	蛋白質結含量 (%)	半衰期(小時)			清除(%)		
				正 常	腎 病	肝 病	肝 臟	原形於 尿 中	糞 便
IM	4.9	1~3	60~95	2.4~3	3.5~5	7~14	85	10~15	3.6
IV	14.7	0							

◆適應症:

由厭氣菌、鏈球菌、葡萄球菌、肺炎雙球菌等具有感染性菌株所引起之感染症。

◆用法用量:

治療厭氣菌感染時，最初使用注射的Clindamycin，然後再改用口服的Clindamycin。

用量:成人—一般是600~1200mg / 日；較嚴重時1.2~2.7g / 日，分成二~四相等劑量。當有生命危險時，可每日靜脈投與4.8g。

小孩(一個月以上)—一般是15~25mg / kg / 日(350mg / m²/日)；較嚴重時25~40mg / kg / 日(450mg/m²/日)，分成三~四相等劑量。

用法:IM—一次劑量不可超過600mg，而且必須深部注射。

IV—必須先經稀釋成濃度在12mg/ml以下，然後再輸注投與。

劑量(mg)	稀釋液(ml)	時間(min)
300	50	10
600	50	20
900	100	30
1200	100	40

每次投與1小時內不可超過1200mg,而且避免延長使用輸液管。

稀釋液: Sterile Water for Injection, 0.9% Sodium Chloride Injection, 5% Dextrose Injection, Lactated Ringer's Solution.

本藥限由醫師使用。

◆注意事項:

一、副作用

造血機能—嗜伊紅血球過多

過敏性—丘疹、麻疹樣皮疹

肌肉與骨骼—多關節炎

局部反應—注射部位疼痛、硬化、無菌濃瘍、血栓性靜脈炎

二、藥品的相互作用

1.本品因有神經肌肉阻斷性質，故可能會促進其他類似藥品之作用，而必須小心配合使用。

2.在體外試驗已經發現Clindamycin與Erythromycin是拮抗性的。

三、小心使用

1.對Clindamycin或Lincomycin有過敏病歷的病人，禁忌使用本品。

2.不要用於治療輕微的細菌或病毒感染。

3.因為本品不易進入腦脊髓液，所以不可用於治療腦膜炎。

4.因為本品會出現在乳汁中，所以授乳婦應避免使用，以防止對嬰兒產生問題。

5.當本品被投與新生兒及嬰兒時，應監視其器官系統之功能。

6.患有嚴重腎病或肝病之病人，使用本藥高劑量時，應監視其血清中濃度。

◆儲 藏: 本品應於室溫之下貯存。

◆包 裝: 2,4,6ml x 10, 50A.

2,4,6,10,20ml x 10, 50V.

衛署藥製字第031368號

G.M.P: G-1275



南光化學製藥股份有限公司

台灣·台南市新化區中山路1001號

TEL:(06)5984121(代表) FAX:(06)5981845