

“中國化學”

硫酸鎂注射液 100 公絲/公撮

Magnesium Sulfate Injection 100mg/ml

“C.C.P.C.”

網號：Q61

成分：Each ml contains：

Magnesium Sulfate Heptahydrate 100mg

適應症：子癇症，子癇前症，妊娠毒血症，產科全身麻醉輔助；體內鎂離子缺乏時之補充。

用法·用量：本藥限由醫師使用。

- (1)子癇症，子癇前症，妊娠毒血症，產科全身麻醉輔助：通常每日量 1~10Gm I.V. 或 I.M.，子癇症時頭一次授予 4Gm，後每半小時靜脈注射 5ml (0.5Gm)。
- (2)體內鎂離子缺乏時之補充：本劑每 ml 含 Mg^{2+} ：0.81mEq，僅限用於全靜脈營養輸注液調配使用。請勿直接單獨做末梢靜脈內點滴注射。

副作用：

高劑量時會引起鎂離子中毒、熱感、血壓下降、抑制中樞神經，以及呼吸麻痺等現象，解毒方式，可以鈣離子製劑(如葡萄糖酸鈣注射液)以靜脈注射補充。

注意事項：

- 1.有腎功能障害之患者；高鎂血症患者；腸內有寄生蟲之小孩患者及有心臟疾病患者必須審慎投與，以免造成危險。
- 2.妊娠婦投與時，由於硫酸鎂很容易通過胎盤，曾經有引起極少數新生兒之高鎂血症，故應小心投與。
- 3.本劑與含有磺胺劑、鹼性碳酸鹽、碳酸氫鹽、酒石酸鹽、可溶性磷酸鹽、砷酸鹽、溴化鉀、溴化銨等製劑一起混合使用時會有沉澱產生，配合時必須注意。
- 4.本劑若用於體內鎂離子缺乏時之補充因而做全靜脈營養輸注液調配使用時，請勿單獨做末梢靜脈內點滴注射。
- 5.本劑若與其他全靜脈營養輸注液調配混合後，請儘速使用。
- 6.硫酸鎂中毒時常引起呼吸停止，應隨時注意血中濃度並給予鈣劑注射解毒。

貯存：室溫貯存。

包裝：200 公撮玻璃瓶裝。

賦形劑：Water for Injection



中國化學製藥股份有限公司

CHINA CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
總公司：台北市襄陽路 23 號 TEL：(02)23124200
新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號 ©