

“濟生”

# 林格爾氏液

Liquor Ringer Injection "CHI SHENG"

成 分 Each ml contains:

主成分

Sodium Chloride.....8.5 mg

Potassium Chloride..... 0.3 mg

Calcium Chloride Dihydrate...0.33 mg

賦形劑

Water for injection

電解質組成：

Na<sup>+</sup>145.3mEq/L, Ca<sup>++</sup>4.5mEq/L, K<sup>+</sup>4mEq/L,

Cl<sup>-</sup>153.8mEq/L.

滲透壓比：約1

適應症 手術時之出血、腹膜炎、火傷、胃腸潰瘍、傷寒、赤痢、大腸炎、敗血症及各種中毒時之營養及水份缺乏症。

用法用量 皮下、靜脈點滴，視病情之所需而決定使用量。  
本藥限由醫師使用。

注意事項 (一)取用時：  
(1)運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動若發現有上述情形時，請勿使用。  
(2)若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。  
(二)輸液套選用及插入法：  
(1)請依輸液套使用方式正確使用。  
(2)請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞，插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。  
(3)使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

包 裝 50毫升、100毫升玻璃安瓿  
500毫升玻璃瓶裝  
250毫升、500毫升、1000毫升塑膠瓶裝  
500毫升、1000毫升塑膠軟袋裝  
※本品應避光儲存於25°C以下。

內衛藥製字第004587號



濟生醫藥生技股份有限公司

CHI SHENG PHARMA & BIOTECH CO., LTD.

新竹縣湖口鄉勝利村實踐路3號

3276-04 電話：(03) 5 9 8 3 8 1 1