"生達"高克痢懸乳液
PECOLIN SUSPENSION "STANDARD"

內衛藥製字 第 008873 號
醫師藥師藥劑生指示藥品
版本日期 2022-05-06

1 成分

1.1 有效成分及含量

每ml含有：
Kaolin……200mg
Pectin……10mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Sorbitol Solution 70%、Glycerin、Benzoic Acid 30%、Silicon Resin、Pineapple、Tween 60、Purified Water

2 用途(適應症)

暫時緩解輕微或中度急性腹瀉。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.1.2 血便或黑便的人。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 12歲以下。

3.2.2 有發燒及全身症狀者、最近使用過抗生素者、有潰瘍性結腸炎或類似病症的人。

3.2.3 便中帶有黏稠液體的人。

3.2.4 帶有嘔氣、腹痛、腹部膨脹等症狀之急性下痢的人。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.3.2 服用其他藥物的人。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 腹瀉最重要的治療是水份與電解質的補充，止瀉劑只能做為輔助性治療。

3.4.5 不嚴重的腹瀉，不吃藥也可能自行痊癒。

3.4.6 本藥品與其他藥品至少間隔3小時服用。

3.4.7 使用前須搖勻，並使用廠商所附量器量取藥量。

3.4.8 止瀉劑之服用間隔應在4小時以上。

3.4.9 急性腹瀉不得使用超過48小時。

4 用法用量

腹瀉後使用，每次間隔至少4小時，1日不得超過4次。12歲以下之兒童應在醫師藥師藥劑生指示下使用，不宜自行使用。

成人及12歲以上	每次30ml
6歲以上未滿12歲	每次15ml
3歲以上未滿6歲	每次7.5ml

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.1.1 若有任何不適情況產生。

5.1.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

5.1.3 病情加重或腹瀉超過兩天以上。

6 包裝

30毫升-4000毫升塑膠瓶裝。

7 儲存方式

請儲存於25℃以下。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

製造廠

生達化學製藥股份有限公司二廠　　台南市新營區開元路154號

藥商

生達化學製藥股份有限公司　　台南市新營區土庫里土庫6之20號