


"信東" 信保欣 膠囊

Cephalexin Capsules

Cephalexin 是由頭孢子菌素 (Cephalosporin C) 衍生而來之半合成抗生素，其構造為 8 元之 β -lactam-dihydrothiazine Ring 為骨架，異於 Penicillin 7 元之 β -lactam-thiazolidine Ring 構造式如下：



1

Cephalexin 為單結晶水之白色晶形粉末，其作用機序類似 Penicillin 之抑制細菌細胞壁之 Mucopptide 合成，Penicillinase 不影響其作用，是廣效性之抗生素，不受酸之作用，口服易吸收血中濃度 (口服 250 mg) 可達 4.5 ~ 6.8 mcg/ml 分佈很廣，如體液、肺、脾、肝、胰臟、心臟、胃壁、腹膜、盲腸、膽囊、陰道、腎臟等。口服後約 90% 不改變分子型式由尿中排出體外。

對 Gram (+)、Gram (-) 菌，如化膿性鏈球菌、肺炎雙球菌、白喉桿菌、草綠色鏈球菌、大腸菌、肺炎克雷白氏菌、奇異變形桿菌、流行性感官嗜血桿菌、淋病雙球菌、腦膜炎雙球菌、沙門氏族菌及志賀氏菌屬等皆有效。

【成分】

主成分：Each Capsule Contains : Cephalexin.....250mg (Potency)

2

賦形劑：Magnesium Stearate、Capsule Shell (含 Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide、Tartrazine)。

【適應症】

有感受性細菌所引起之泌尿生殖道、呼吸道、柔組織及皮膚等感染症。

【注意】

(1) 曾對 Cephalosporin 系製劑有過敏反應之患者不可使用本劑。

(2) 有下列情形之患者宜謹慎使用。

1. 對 Penicillin 製劑有過敏反應之患者。
2. 易引起支氣管喘息、發疹、蕁麻疹等過敏現象體質之患者。
3. 高度之腎機能障害患者。

(3) 服用本劑後倘有口內異常感覺、喘鳴、眩暈、便意、耳鳴、發汗、發疹、蕁麻疹、紅斑、搔癢、發熱、淋巴腺腫脹、關節痛等症狀出現時

3

，應即中止使用而改以其他藥劑 (如：Pressor amines, Corticosteroids and / or Antihistamines) 治療。

(4) 服用本劑偶有食慾不振、噁心、嘔吐、下痢、軟便、胃部不快之胃腸症狀出現。

(5) 臨床上曾有性器、肛門搔癢症、膿炎、嗜酸性白血球增多、嗜中性白血球減少及 SGOT, SGPT 輕度上昇之報告。

(6) 服用本劑後，可能有假性糖尿反應，可用 Clinistix 試劑則不生此現象。

【用法・用量】

口服：成人一次 250mg，每 6 小時一次。

小孩一天 25 ~ 50mg/kg，分四次服用。

本藥須由醫師處方使用。

4

【保存條件】

儲存於室溫 (15 ~ 30 °C)、緊密容器。

【包裝】

8~1,000 粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第 006747 號



信東生技股份有限公司 觀音廠
桃園市觀音區國建一路 1 號

5

"信東" 信保欣 膠囊

1000 粒

Cephalexin CAPSULES

成分：

每粒中含有 Cephalexin.....250mg (力價)

適應症：

有感受性細菌所引起之泌尿生殖道、呼吸道、柔組織及皮膚等感染症。

注意事項：

請詳閱說明書。

用法・用量：

請詳閱說明書。
本藥須由醫師處方使用。
衛署藥製字第 006747 號



信東生技股份有限公司 觀音廠
桃園市觀音區國建一路 1 號

54031339 ④

內有說明書請由此打開

"信東" 信保欣 膠囊

1000 粒

Cephalexin CAPSULES



信東生技股份有限公司 觀音廠
桃園市觀音區國建一路 1 號