

鎮 暈 劑

“強生”美克利靜錠 25毫克

MECLIZINE HCl TABLETS 25mg “JOHNSON”

內衛藥製字第 012916 號

【成分】 Each tablet contains :

有效成分及含量：Meclizine Hydrochloride.....25mg

其他成分(賦形劑): Alcohol 95%、Avicel 101、Densil、Magnesium Stearate、Povidone K-30、Sodium Starch Glycolate (Primojel)、Starch、Water Purified

【用途(適應症)】預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
曾因本藥成分引起過敏。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
1. 12 歲以下。
 2. 嚴重代謝性腎疾病的人。
 3. 曾診斷有下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺功能亢進、腎臟病。
 4. 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難；及青光眼的人，因前列腺腫大引起排尿困難的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
1. 孕婦、可能懷孕婦女及授乳婦。
 2. 65 歲以上。
 3. 接受醫師治療並服用藥物的人。
 4. 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
 5. 服用其他鎮暈藥、綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鼻炎藥或抗過敏藥的人。
 6. 服用本藥若有不了解之處。
- 四、其他使用上注意事項：
1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 避免陽光直射。
 3. 勿超過建議使用量。
 4. 不得與酒精性飲料併用。
 5. 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

【用法用量】

成人及 12 歲以上	預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前 30-60 分鐘前服用，1 次 2 錠，一天服用一次。
12 歲以下	請洽醫師診治。

【警 語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部分	副作用
神經系統	思睡、倦怠感、興奮。
皮膚	發疹、發紅、癢疹。
其他	頭痛、臉紅、心悸、排尿困難、暈眩、浮動、不安定感、口乾、便秘及下痢、視覺上之困擾。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

- 【包裝】 1,000 錠以下 塑膠瓶裝。
- 【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。
- 【儲存】 本藥應儲存於 25°C 以下緊密容器，避光貯存。



Code No. : G-04

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市 241 三重區三和路四段 77、79 號

訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405