

"生達"醫鼻易噴鼻液 0.5 毫克 / 毫升 (異每達佐林)

SINDECON NASAL SPRAY 0.5MG/ML "STANDARD" (OXYMETAZOLINE)

衛署藥製字 第 035546 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

版本日期 2022-05-06

本藥的主成分Oxymetazoline是局部血管收縮劑，主要用於緩解鼻黏膜充血、腫脹引起的鼻塞症狀。

本藥為鼻噴劑，主要作用於鼻腔位置，較無全身性的作用以及不良反應。

作用及特點：

- 1.Oxymetazoline Hydrochloride為一種交感神經興奮劑中之局部血管收縮劑，具有強力的血管收縮作用，對於鼻黏膜腫及鼻充血患者能使腫脹及充血皺縮，而且藥效迅速且持久，安全性高。
- 2.本劑對循環及一般生理狀況絕無不良影響。
- 3.本劑能減少分泌物之滲出，但並不抑制黏膜的正常分泌，故不會引起不舒服的燥熱症狀。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每毫升含有：Oxymetazoline Hydrochloride.....0.5mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Sodium Chloride、Methylparaben、Propylparaben、Potassium Phosphate Monobasic、Sodium Phosphate Dibasic、Water for Injection

2 用途(適應症)

急性鼻炎、過敏性鼻炎、血管舒縮性鼻炎、鼻竇炎、鼻咽炎。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

- 3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 3.1.2 6歲以下。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

- 3.2.1 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、甲狀腺機能亢進、糖尿病及因前列腺肥大引起排尿困難。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

- 3.3.1 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.4 其他使用上注意事項

- 3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。
- 3.4.2 避免陽光直射。
- 3.4.3 勿超過建議使用量。
- 3.4.4 噴鼻器請勿與它人共用，以免造成感染。

4 用法用量

年齡	劑量
成人及6歲以上	每天1-3次，每次兩鼻孔各噴一下
6歲以下	請勿使用

5 警語

5.1 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

- 5.1.1 若有任何不適情況產生。
- 5.1.2 自覺狀況沒有改善或更惡化。

6 包裝

100毫升以下塑膠瓶裝

7 儲存方式

25°C以下貯存。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品

製造廠

生達化學製藥股份有限公司 台南市新營區土庫里土庫6之20號

藥商

生達化學製藥股份有限公司 台南市新營區土庫里土庫6之20號