



抗黴菌性抗生物質

NYC-005
衛署藥製字第18895號

“永信”

寧司泰定 Nystatin

膠囊

Capsules "Yung Shin"



3.98cm

糖尿病、懷孕、口服避孕藥、X光照射、放射性療法、類固醇荷爾蒙、肥胖、肝炎、缺鐵性貧血、多汗、甲狀腺機能不足、副甲狀腺機能不足、白血病、淋巴瘤、虛弱、陰道不潔、陰道內pH偏鹼性、抗滴蟲製劑、抗生素（尤其是廣效性抗生素）……等因素在黴菌的增殖上均佔有很重要的地位。一旦感染了念珠菌症，則持續不斷的分泌物、燒灼感、紅腫、惡臭及強烈的搔癢，而令患者痛苦不堪，因此正確的診斷以及徹底的根治實為當務之急。

【成分】每膠囊中含：

Nystatin.....500,000units

【賦形劑】

Colloidal Silicon Dioxide、Polyvinylpyrrolidone、Lactose、Talc、Magnesium Stearate、Capsule #2 (Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Titanium Dioxide、Sunset Yellow FCF)。

【特徵】

1. 本藥為Polyene類之抗生素，可與黴菌細胞膜內之固醇類(Sterols)相結合而改變其滲透性，使其細胞內容物滲出因而死亡，故能充分發揮其獨特的殺黴作用。
2. 本藥除了白色念珠菌(*Candida albicans*)之首選藥物之外，舉凡芽生菌屬（如*Blastomyces brasiliensis*、*Blastomyces dermatidis*）球黴菌屬（如*Coccidioides immitis*）囊球菌屬（如*Cryptococcus neoformans*）組織漿菌屬（如*Histoplasma capsulatum*）等全身性感染菌屬；表皮真菌屬（如*Epidermophyton floccosum*）小芽胞菌屬（如*Microsporum audouinii*、*Microsporum canis*）毛髮菌屬（如*Trichophyton rosaceum*、*Trichophyton rubrum*）等好發於表皮之感染菌屬均可奏效。
3. 本藥即使長期連用亦不引起抗藥性。
4. 本藥若併用於甲溝炎、鵝口瘡、陰道念珠菌症之治療時可消除腸道內念珠菌而減少再感染的機會，因此使得療效更加迅速、確實。
5. 本藥尚可併用於口服廣效性抗生素以預防廣效性抗生素因不完全吸收，以致於減少腸內正常細菌叢而發生念珠菌的過度增殖(Overgrowth)及重複感染(Superinfection)。
6. 本藥不影響體內的細菌類的生長、繁殖，僅對於病原性黴菌類有選擇性的殺黴作用。

【適應症】

腸道念珠菌感染症之預防與治療，當廣效性抗生素或類固醇療法時併用為念珠菌過度增殖之預防療法。

【用法·用量】

通常每次1~2粒(500,000-1,000,000units)，一天三至四次服用之。（當臨床症狀消失後仍需繼續服用48小時以上，以防其復發）。
本藥須由醫師處方使用。

【副作用】

腸胃道

腹瀉（包括一例是血痢）、噁心、嘔吐、腸胃不適

皮膚

紅疹、包括蕁麻疹為罕見。Stevens-Johnson症候群非常罕見。

其他

心跳過快、支氣管痙攣、臉部腫脹與不明原因的肌肉痛為非常罕見。

【禁忌】

對本藥所有成分有過敏史的患者。

【注意事項】

一般

1. 本藥不能用於治療全身性的真菌感染。

2. 使用期間若出現紅疹等過敏症狀，應停止用藥並就醫。

致癌、突變、生育力受損

沒有長期的動物試驗可用來評估Nystatin的致癌性。也沒有任何研究資料可以用來判定Nystatin是否有致突變性或影響男性或女性的生育力。

懷孕及哺乳

致畸性分類屬C類

本藥對孕婦及哺乳婦之安全性尚未建立，故孕婦及哺乳婦應慎重投與。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

6~1000粒塑膠瓶裝、鐵罐裝。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2141477