

尺寸：9.8x15cm

顏色：DIC PART II版 2394

DIC 12版 564

衛署藥製字第010414號
Code No.31301

眼用“溫士頓”
溫拿可通 軟膏

Eye, Winacort Ointment "Winston"

本劑所含Triamcinolone Acetonide係1955年Bernstein所創製之Glucocorticoid屬之副腎皮質類固醇類，具有很強之抗炎症作用及抗Allergic作用，使用本品於治療眼睛感染、過敏性反應、外傷及手術後之種種情況，其效力為Hydrocortisone之10倍，Prednisolone之3~5倍，且具有改善及消炎的作用，能使症狀迅速轉好，獲得良好結果，本劑另配合有Neomycin Sulfate係為一種廣效性抗生素，對革蘭氏（+）、（-）及耐酸性細菌皆有效，可使用於預防或治療局部感染症，有意想不到的療效，本劑不會產生類固醇之全身性副作用及新黴素之全身副作用，能使醫師獲得極優越的治療效果而無不良副作用，由臨床多數病例研究所獲結果，證明本劑的效果超越於其他副腎皮質類固醇及抗組織胺藥物。

【成分】

Each gram contains：

Neomycin Sulfate.....5mg
(Equivalent to Neomycin 3.5mg. (potency))
Triamcinolone Acetonide.....1mg
賦形劑：Liquid Petrolatum、White Petrolatum

【特長與作用】

- 1.使用本劑於局部感染，從未有過全身反應之病例出現。
- 2.無鈉或水分之滯留作用且無低鉀症狀。
- 3.以極少量的平均劑量，即具有Prednisolone或Prednisone同等的抗炎症及抗過敏作用。
- 4.對青黴素有抗藥性的葡萄球菌，proteus,pseudomonas,coliforms及bracella等對其他抗生素無效者，用本劑效果極佳。
- 5.含強力抗菌作用之抗生素Neomycin Sulfate，能應用於細菌性疾患之治療。

- 6.對以往之腎上腺皮質荷爾蒙無從獲得充分的效果及因副作用不能繼續治療之患者，亦能發揮優異效果。
- 7.本劑用於點眼時，毫無刺激感。
- 8.保護黏膜，解除疼痛，絕無不快感。
- 9.療效持久。

【適應症】

眼瞼炎、結膜炎、鞏膜炎、虹彩炎等炎症性眼疾患，急慢性、過敏性及手術後之眼疾患。

【用法用量】

將本藥膏適量塗抹於下結膜囊，即下眼瞼與眼球之間，每日三至四次即可；必要時可以增至每兩小時塗抹一次，初時可能由於藥膏蓋於角膜上面，或有一過性之視線模糊。本藥須由醫師處方使用。

【注意及禁忌】

所需注意及禁忌與其他副腎皮質類固醇與新黴素合製劑相同，對極少數有新黴素過敏性者，應考慮不用。單純疱疹為絕對的禁忌症，如有刺激症狀及所治療之疾病惡化或加上他種感染，應當停止續用。正如所有效果強烈之藥品，本藥必須謹慎而適當的使用，一有任何反應出現，即應停止使用。

【包裝】

100公克以下積層管裝、鋁管裝。

【儲存】

25℃以下緊密容器貯存。

1503-01



Made in Taiwan

溫士頓醫藥股份有限公司

台南市永康區鹽洲里仁愛街117號

0 0 3