

130.00 mm

150.00 mm

“晟德”

喘解液
Exdila Liquid

5微克/毫升

5 μ g/ml “Center”

GMP
衛署藥製字第 044482 號
G-7556

主 成 份 每毫升(ml)含有
Procaterol Hydrochloride Hemihydrate.....5.0 μ g

適 應 症：

支氣管氣喘、慢性支氣管炎、肺氣腫諸疾患之氣道閉塞性障礙。

用法用量：本藥須由醫師處方使用

通常成人：1回10毫升(相當Procaterol HCl 50 μ g)，1日1回，睡前服用；或1日2回，早晨及睡前各服用10毫升。

6歲以上的孩童：1回5毫升(Procaterol HCl 25 μ g)，1日1回，睡前服用；或1日2回，早晨及睡前各服用5毫升。

未滿6歲的孩童：1回0.25毫升/公斤(Procaterol HCl 1.25 μ g)，1日2回，早晨及睡前各服用1回或1日3回，早、晚睡前各服用1回。

得依年齡及症狀適當增減。未滿6歲的孩童1回標準量如下：

未滿1歲：2~3毫升 (Procaterol HCl 10~15 μ g)

1~3歲：3~4毫升 (Procaterol HCl 15~20 μ g)

3~6歲：4~5毫升 (Procaterol HCl 20~25 μ g)

特 性：

1. 支氣管擴張作用：

本劑能緩解支氣管痙攣作用，與Isoproterenol有同等支氣管擴張的作用，但較Salbutamol 等強。

2. 支氣管擴張作用時間持續長久：

本劑支氣管擴張時間持續較Isoproterenol，Salbutamol長。

3. β 2-感受體選擇性高：

本劑對心血管系無不良影響，對心血管系及氣管的 β 2-感受體的親和力較Isoproterenol，Salbutamol優。

4. 抗過敏作用：

本劑對誘發氣喘的游離組織胺(Histamine)有強力的抑制作用。

5. 對氣管的分泌作用：

本劑能促進氣管內纖毛亢進作用，而顯著的影響氣管分泌作用。

注意事項：

1. 甲狀腺機能亢進、高血壓、心疾患、糖尿病患者、孕婦宜慎重投與本劑。
2. 偶有心悸亢進、顏面潮紅、耳鳴、頭痛、胃部不適、口渴、全身倦怠、皮疹等現象。
3. 本劑與Epinehrine，Isoproterenol，Catecholamine併用引起不整脈，應避免併用。
4. 本劑對Allergen引起的皮膚反應有抑制作用，欲實施皮膚試驗時，須在12小時前停藥。

賦形劑：Sucrose, Benzoic Acid, Alcohol, Sodium Citrate, Edetate Disodium, Grapefruit Flavour, Water Purified

包裝：20~4000毫升塑膠瓶裝

儲存：

- (1) 本品應置於兒童不及之處。
- (2) 請密封儲存於25℃以下，毋須冰存並避免陽光直射。

晟德大藥廠股份有限公司(公司)

CENTER LABORATORIES INC.

地址：臺北市南港區園區街3之2號7樓

晟德大藥廠股份有限公司新竹廠(製造廠)

廠址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

公司電話：(02)2655-8680 圖文傳真：(02)2655-8380

工廠電話：(03)598-1829 圖文傳真：(03)598-1820

CTRA-038 20150728

14E01-D01